

F. XIII. C

50923/B

18

24824.

Warren
30/11/10.

LAURENTII TERRANEI

Ph. & Med. Doct. Colleg. Taur.

DE

GLANDULIS UNIVERSIM,

ET

SPECIATIM

AD

URETHRAM VIRILEM


NOVIS.



LUGDUNI BATAVORUM,

Apud { THEODORUM HAAK, } 1729.
&
{ SAMUELEM LUCHTMANS. }





Illustriſſimo Ampliſſimoque D.

D. JOANNI BAPTISTÆ DE AURIA

Marchioni Ciriaci, & Mari, Comit
Petrælatæ, & Dulcini, Vallis Eccleſiæ
Condomino, Domino ſupremo Te-
ſtici & Ceſii, S. S. Mauriti, & La-
zari Majorum inſignium Equi-
ti, Prioratus Ripaliæ Com-
mendatario, Ducatus Au-
guſtæ Gubernatori, &
Magno Baglivo,

Et S. R. C. Caſtrorum Præfecto.

LAURENTIUS TERRANEUS

Servus, Subditus, Medicus

S. P.



USPICEM *mibi novum non in-
voco, dum aliquem AB AURIA
Heroem mibi Patronum eſſagito,
Illuſtriſſime Ampliſſimeque Do-
mine, Ab illâ videlicet Stirpe
Nobiliffima, cujus in ſolâ primam in lucem pro-
diſſe, ſub umbra creviſſe, cujuſque Taurinum
transplantatæ ſequarem fuiſſe gloriari hoc quoque
potest*

(a.) Ab potest familia mea, fidelius subdita æquissimæ
 Ardoi- Dominationi, devotius addicta amplissimæ Di-
 no, San- gnitati, firmitus obstricta largissimæ Beneficentiæ,
 sovin. Excelsæ, Potentis Nobilissimæ Domus Tuæ, præ-
 Famil. cipui, ne dicam Unici, præsidii, & decoris meæ.

Illustr. Terrere, fateor, tenuis hujusce dedicationis au-
 b Uber- daciam debuisset ipsa vel AURIACI nominis
 to, Con- Magnitudo, ex ARBOREIS (a) Narbonæ Co-
 rado, mitibus fœlicissimè Auspicati; Ab Amplissimis
 Lamba, Urbis, & Classis Januensis Præfectis (b) magno
 Pagano, regimine, multâ victoriâ Reipublicæ suæ utilissimis
 Philip- inclytè propagati. AURIACUM nomen, quod
 po, Lu- æternâ gloriâ illustravit alter ille Neptunus, (c)
 ciano, Gallie, indéque Germaniæ exercituum Imperator
 Petro Strenuus, Prudens, Fœlix: Reipublicæ suæ, Im-
 Anto- perii, Fidei hostibus non modò, sed magis Fortunæ,
 nio, & Patriæ in Principem suum invocanti, invi-
 Thoma, & Patriæ in Principem suum invocanti, invi-
 Sanso- vin. Ibid. etus, magnanimus HEROS, quem Imperii colu-
 (c.) An- men Melphidis Principatus cum grandioribus ti-
 dreas. tulus à Cæsare collatus; Patriæ Patrem, ac As-
 (d.) Lo- sertorem æternum publicæ Statuæ decus, plau-
 renzo dente Civium gratitudine erectum, atque observa-
 Capello- tum: Sæculi sui miraculum ac Virum incompa-
 ni Hist. rabilem plenæ eodem Historiæ (d) magnificè con-
 (e.) Fri- dericus testantur.

Nico- Moratur Certè meam Patrocinii Tui ambitio-
 laus, nem, VIR AMPLISSIME, illa, quâ suprà
 Rapha- communem Nobilium sortem emicuerunt majores Tui,
 el, duo (e) Dignitas Supremi Principatus, atque Dominii
 Domi- Urbis, & Vallis, quæ licet ditionis amplitudine
 nici, al- paucis inter Ligusticas, cœli profectò temperie, at-
 ter Ni- que clementiâ, Soli amœnitate, ac beneficentiâ, po-
 colaus, puli frequentia, ingenio, fortitudine nulli cedit. Cu-
 Hiero- jus
 nymus.

jus dominium ut gloriosissimum, ac potens fuit Majoribus Tuis, atque Principibus, æquitate ac magnificentia erga suos, rerum omnium ac præsertim militaris, in primis maritimæ præfecturæ peritiâ apud maximos Europæ Principes summo in honore habitis, (f) ita ejusdem in Regnum sub-alpinum (f.) De adjectio finitimis invidiosa, Sabaudis felicissima quibus fuit: dum & prioribus bellis victa, sed fida, ultimò Aug. Jus sola inter Sabaudo-Ligures se solâ victrix, præstinianus senti ideò intacta, Regno portus tutissimi, Regique Ann. Principibus asyli loco, gloriosissima semper stetit Gen. U. & bellus, & Au-

ONELIA.

Pretiosior tamen adhuc, quàm ditionis ad Regiam potestatem, visa est Familiæ Tuæ ad Pedemontanam Aulam accessio: Illius nempe Familiæ, quæ ut Heroes (quorum dici seminarium potest) Celsissimis totâ Europâ Principibus suffecerat, omnes jam, seque totam devovit Sabaudicæ Augustis. Quam ideo grandium compensatione Feudorum, primariis Dignitatibus, muneribus, ac favoribus eximiis excepere semper Regi Principes, Aula gratulationibus, Regnum universum amore, admiratione, plausu; utpote ad Regem columinis, ad Aulam ornamenti, ad Regnum felicitatis pars magna: Quod non modò in ATAVO, AVO ac PATRE TUO summis dignitatibus, Classis Pedemontanæ Præfecturis, Supremis Regii stabuli, atque Palatii Magisteriis, supremoque Torque decoratis toto coram orbe enituit, sed in Te Maximè, ILLUSTRISSE ATQUE AMPLISSE DOMINE, in quo omnigenæ eruditioni mirabiliter copulatur Rerum Militarium peritiâ singularis, ac magnanimitas, ut in ar-

mis tum Cæsareis, tum Sabaudis bello Hungarico, & Pedemontano, ibi catholicæ Fidei Voluntarius Miles, hic Prætoricæ cohortis Subcenturio, ubique Heroicus Cæsaris, atque Victorii Magni triumphos promoveris, Tuâque ex parte feceris; cujus Natalium Granditas, alloquii Ornatus, actionis Magnificencia, atque in publicis, Aulicis, Regiisque negotiis Peritia Maxime claruit in illis tum ad Christianissimum Regem, & Burgundiæ Ducem, tum ad Philippum in Hispanias amplissimis utriusque nuptialis fœlicitatis Legationibus, magno triplicis Aulæ, Gallicæ, Hispanæ, Sabaudæ consensu; gratulatione, plausu. Hinc accessit Nobilissima dignitas Gubernatoris, ac Supremi Prætoris Ducatus Augustani, & Castrorum Præfetti. Hinc majora parat Princeps, plura parat Fortuna; Ille ut Dignitatibus parem, Hæc ut Dominiis ampliorem faciat Majoribus Tuis, ut meritis parem agnoscit, & quôque Majorem.

Thomam,
Alexandrum.

Paulum
Dominicum
Hyacinthum.

*Prætereo (quos præterire mea non potest erga Ipsos reverentia) Illustrissimos ac Reverendissimos Abbatiarum Præsules PATRUUM ac FRA-
TREM mentis sublimitate, animi magnitudine, morum nobilitate gravissimos, & ornatissimos Viros, qui Doctrinæ præstantiam, virtutis splendorem, Religionis dignitatem, Auctoritatem, exemplo, specie ipsâ sustinent, confirmant, extollunt. Prætereo ex Fratribus Tuis Amplissimis illum militaris scientiæ, operæ, dignitatis Peritiâ, prudentiâ, strenuitate Heroem, opere fortissimum Militem, Dignitate meritissimum Equitum Catapultarium Magistrum, & Supremum turmarum Ductorem. Nec non CAROLUM FRANCIS-
CUM*

CUM Hierosolymitanum Equitem generosissimum, Dertonæ Commendatarium, qui in bello Peloponesiaco pro Religione, in Pedemontano pro Subalpino Rege fidissimus, prudentissimus, ac strenuissimus miles ac Ductor fuit. Nec patitur justa Te ad loquentis Epistolæ brevitās ut debitā prosequar laude Primogenitum egregiæ, præclaræque indolis Filium, qui Gloriæ, & grandioribus Aulæ Dignitatibus adolescens, magnis jam virtutibus orditur Virum, scilicet Patrem.

Ut Patrias Laudes sentiat esse suas.

Martial.

Atque Secundo-genitum.

lib. 6 E-

Mens Cui sublimis supra genus eminet
ipsum.

Fig. 38.

Ovidius

eleg. 3.

de Pon-

to.

Grandius ingenio nec sibi nomen inest.

Præclara Majorum gesta se ipsis æterna, imitatione perennaturi, Rerum, bonorumque Studiorum omnium Scientiâ, virtutum omnium, maximèque equestrium cultu.

Audax profectò, qui velit immensum Familiæ Tuae decus ingenti etiam Volumine complecti; ineptus, qui brevibus scriptis attingere: Mihi is unice animus fuit ostendere quot fuerint Majoribus meis, quot mihi adsint Patroni, quantus ex his Tu maximus mihi rebusque meis Mæcenās occurras, quem majori ex susceptis Beneficiis fiduciâ exorare possim, atque sperare ut tenue hoc non voluntatis obsequium modò, sed debitum, humanitate suscipias, Splendore ornes, summæ authoritatis Clientelâ tuearis, permittens libellum illo nomine illustrari, quo Amplissimæ totâ Italia Familiæ Illustres spectantur. Inter quas semper emineat Tua, in qua Tu Vigeas diu.



PRÆFATIO.



RES, quam aggredior, ut non temere omnino suscepta videatur, ut tota pateat; velut candidè scribenti par est, legenti non inutile penitus, saltem non adeò grave: præfari primùm juvabit occasionem, quæ fuerit tentandæ, modum, quis inventæ ac inveniendæ Rei, quam hõc aditu factò intimiùs penetrabo, fusiùs exponam, oculisque subijciam.

Operis
Occasio.

Inter privatam Anatomen, cui quòd adessem non utilitatis minus quàm honoris capiebam, forte contigerat, ut de propudioso Gonorrhœæ morbo, ejusque sedè potissimùm incideret sermo. Inter multiplices, quæ in medium afferebantur, sententias, altera erat quæ Gonorrhœæ sedem Prostatas assignat, altera quæ ipsam Penis substantiam; hæcque *Sydenhamii*, (a) quam fusiùs exponit *Musita-*

(a) *Epist. ad Henr. Pamam De Luis Ven. hist. & cur.*

Sitanus, (b) diverso tamen theoremate. (b) *De*
 Prima communi opinione recepta mihi ^{*Lue*}
 magis arridebat; pro secunda tamen, quum ^{*ven. lib.*}
Sydenhamii magna esset apud me & gra- ^{*3. c. 2. de*}
 vis auctoritas, propter eximiam Viri in ^{*Gonorrh.*}
 Re Medica prudentiam, & scribendi
 candorem cum gravitate conjunctum, pro
 Egregii, inquam, Viri sententia tenaciùs
 aliquandiu contendebam, ut eandem
 sua probabilitate donarem, & ad veri si-
 militudinem aptè se habere demonstra-
 rem: eo maxime quòd facilius videretur
 venerea miasmata, per occurrentes facilè
 poros, Penis substantiam subire, quàm
 totam Urethræ longitudinem tranare, &
 in imos profundè aditus agi, ut Prostatis
 labem inferrent. Donec dubitare cœpi de
 sententia plurimas ob rationes, tum quas
 sapiens illud colloquium, tum quas meæ-
 met meditationes obtulerant: atque ob
 illam præ cæteris, quòd minimè asseque-
 rer quibus viis a Penis substantia, ulcero-
 sâ diathesi, affecta saniosum istud, ut pu-
 tant, in Urethram exstillaret. Cœpi etiam
 desistere a sententia, quæ mihi eò videba-
 tur obscurior, quòd examinabatur atten-
 tiùs: Immo jam planè destiteram, nisi
 altiùs adeò insedisset menti *Sydenhamius*,
 ut minimè quiescere animo possem, ni,
 vel repudiandæ vel confirmandæ senten-
 tiæ,

tiæ, Encheiresim adhibuissém, qua in suspectis Venere hominum cadaveribus, an saniosi quidpiam in Urethram erumperet, in minús suspectis, an pusilluli forte meatuli, seu poruli saltem se se proderent ad *Sydenhamii* conjecturam desiderati, attentè perquirerem, & quod in Re Physico-Medica momentosum est, certos in alterutra parte Sensus efficerem.

M. D. CC. I. Eam ob rem, quum Amicorum quorundam suasu, & Studioforum rogatu, clapsò nuper annò Anatomicis vacarem, postquam Partes Genitales more Graafiano exposueram, ac adnotaveram in dato cadavere Spermaticam sinistram Arteriam a sinistra Arteria Emulgente duplici ramo derivatam, laudatis inventis Graafianis, placuit Urethram seponere, & in Musæum deferendam jubere.

Detectio.

Ergo diffissam a parte superiori longitudinaliter Urethram, & undequaque inspectam, subductoque compressam digito gemmare ab ostiolis plurimis liquorem sub-viscidum, & ex albo leviter sub-luteolum miror. Hinc avidissimos intendens oculos repetita compressione ad ulteriorem succi emunctionem Urethram sollicito, varièque pertracto; donec passim turgentes, passim emuncti se se apertissimè fassi sunt canaliculi, clarissi-

rissimèque constitit, non morbosum id aut fortuitum quidquam, sed maximè constans esse Naturæ artificium, ut aliæ confirmarunt Urethræ, quarum satis ingentem nobis copiam faciebat *Scantius*, Primarius nunc Legionis Pedemontanæ Chirurgus, cui primò ista communicabam: Atque in expositas frequenter Urethras repetito contuitu, semper indaginis tœdium fonticulorum copiâ, quasi fœnoris quadam exactiōe pensabam. Hinc toto oculo sequaci Urethram observans, supra Urethræ medium guttas duas reliquis supranotatis majores, duobus hæsitantes foraminulis curiosè notabam. Tum detecti ostiis indicantibus Fluentuli, iisque adacta tenuiori setula permeatis, totidem Fontes, seu Glandulæ duæ; prætereaque præsides veluti istorum fontium Najades Pseudo-Sphincteris musculi fibræ, quarum imperio lubituque fluxurus juxta diversas necessitates, diversa quantitate, variòque modò liquor ministraretur. Et demum ista versantibus nova occurrebant Prostatarum ostiola, unà cum reculis aliquot observatu facilimis, ultroque obviis.

Hæc sanè ut exigua, ut levidensia prosequi, & Publico exponere nimis vanum ineptumque dubitassent, nisi Philo-

lofopho Medico nimis indignum videretur , Deo auctore inditam homini minimam licèt particulam , ut inane quidpiam & nullius momenti despicere , aut faltem negligenter fpectare , quam potiùs ut fuo plenam artificio ac utilitate machinulam , ut fuis quoque morbis obnoxiam , omni excolere ftudio Mirabilis machinæ obfervatorem , & reftauratorem Medicum decet. Hòc fi oculo ifta confpicias nihil in iis abjectum , & vile , nihil obfcœnum videbitur , quo vel candidior lædi poffit modestia , aut nequiffima utcumque proritari impudentia.

Vides Humaniffime Lector , quid occafionis huic invento fuerit , quid caufæ , cur ejufdem , fi non pretium , faltem rationem aliquam a me habendam putaverim ; illoque Publicum fraudare minùs æquum judicaverim , hoc potiffimùm fæculo , ut fapientiffimo , fic Rerum Anatomicarum ftudiofiffimo. Leviffimis & tenuibus etiam rebus pondus & pretium aliquod novitas ipfa , immo dignum humanæ mentis , humanifque rebus aptiffimum curiositatis ingenium conciliat ; In rebus potiffimùm Anatomicis , quarum nulla eft tam nauci tam nihili , quæ (cum præfidem humanæ falutis

tis scientiam semper illustret amplifcet-
que) non sit cum aliquo hominum fru-
ctu, ac utilitate conjuncta.

Certè non inutile penitus hoc tenue
quantumvis inventum fore confido ali-
quot istarum partium morbis, Gonor-
rhæis puta, earumque symptomatibus
melius exponendis, forte etiam tutius
curandis; quod mihi per litteras cando-
re, ac eruditione refertas (quibus me &
honore, & voluptate cumulavit) plenis
authoritate verbis confirmat Vir celebri
nomine meritò spectatissimus *Georgius*
Baglivius: Glandulæ Conglomeratæ, &
Disgregatæ a Te detectæ circa Ure-
thram virilem, viam satis amplam ape-
riunt, abstrusas investigandi causas
quamplurimum Vesicæ, ac Penis Catharro-
rum, qui usque adhuc in recondito latent.
Quem-ad modum & ille qui in Magna-
Græcia Academiæ Incuriosorum, Pytha-
goricis quondam scholis æmulæ, nomen
primus, dignitatem præcipuus, immor-
talitatem præ cæteris unus dedit, *Hya-*
cinthus Gimma Dignus certè vicissim
totidem laude sapientum, quot Ipse Rei-
publicæ litterariæ Proceres, Academiæ
Socios, inter quos eminet, magnifica
laudatione prosequitur, in nobili opere,^{(a) Elo-}
(a) ubi^{gi Aca-}
demic.

*Il nome altrui ad immortal memoria
Con sua penna sublime erge alle stelle:
atque disertissimo me Elogio magnificen-
tius excipiens.*

*Imit. De
Lemene.*

Così gentil fa al glorioso stile

*Soggetto vile, onde virtù si scopra,
Le mie rozze sembianze, e il nome
umile*

*Perchè quallora alti prodigi adopra,
Elegge al suo lavor materia vile
Fabro, che vuol che sol s'ammiri
l'opra.*

Cujus maximum sapientiæ, & quæ
summæ sapientiæ est, animi, erga sapien-
tiæ cupidos, facilitatis beneficium, quòd
studia mea, summa laude, videlicet suâ,
& liberali munere gloriosius, & suavi
stimulô potentiùs promoverè peraman-
ter voluit, gratus agnosco. Vir inquam
Amicissimus & Eruditissimus sic: *apren-
do largo campo à Filosofi di poter non
solo rinvenire molte cose forse sin' ora
ignote intorno all' emissione del seme, e
dell' urina, che per l' uretra si fanno:
ma anche su le cagioni de' mali, che alla
giornata sogliono in essa avvenire. Gem-
meum quoque calculum suum confe-
rentibus Viris Sapientiâ, Dignitate, No-
mine Amplissimis, Luca Tozzi Innocen-
tii XII. Pont. Max. olim Archiatro, Luca
An-*

Antonio Portio Medico Cæsareo, *Agnello De Neapoli*, Illustrissimæ Academiæ Sociis non dicam spectatissimis, sed Patribus optimè meritis. Id etiam per litteras, quibus mihi gratificari placuit, humanissimas confirmarunt, Medicis scientiis & politioribus litteris ornatissimus *Nicolaus Lanzani*; & propter singularem animi candorem ac eruditionem amicissimus P. *Matthæus a Cadratio* Ordinis Capucinatorum, Medicus Taurinensis, Academici laudatissimi; nec non Phlebotomiæ Vindex Felicissimus, & de Re Medica optimè meritus *Matthæus Georgi*, in scientiis non minùs, quàm in Albinganensi Civitate Patricius; & demum Vir eximiis laboribus promeritâ nominis famâ nulli Clarissimorum hujus Ævi Medicorum secundus *Jac. Mangetus* velut Coronide exornavit.

Tanto Sapientum favori ut, imparibus licèt, datis tamen, additisque ipsorum auctoritate viribus quoquo modo respondeam, præsentium Glandularum statum præter-naturalem indagare saltem adnitar statim ac, quam instituo tractatiunculam statûs earundem merè naturalis observatione contentam explevero.

Quòd si meam hanc tractationem ut multipliciter vitiosam insimulas; facis quidem

dem pro ratione, cui me candidè assentientem habes, non tamen pro humanitate Tua, qua Te ignoscentem velim, *Lector Benevole*, quæ præcipua mihi alioquin fuit timidum hunc libellum in publicum producendi spes & fiducia, quem ut Tibi minùs molestum facerem, minorem feci: *succinti quæ sint bona libelli* ipso edoctus *Martiali*. Nec magnum aliquid ut a me expectes; mea tenuitas; juvenilis ætas, & perversa rerum mearum conditio permittunt. Ultimò, si mihi Zoilum liceret suspicari, monerem:

*Aptatur
Martialis
Epig.
1. ad lib.
2.*

*Martial.
in Xen.
Epig. 2.*

*Ne perdas operam: qui se mirantur;
in illos*

*Virus habe: nos hæc novimus esse
nihil.*

LAURENTII TERRANEI,

Ph: & Med: Doct: Colleg:

Taur:

CAPUT I.

De Glandulis Disgregatis in Genere.

Uemadmodum aeri terræque, Glandu
 leni humectatione ac refrige- larum
 riō temperandis ac refocillan- disgre-
 dis, in suavem rores asper- gata-
 ginem, ac tenuem in guttu- rum.

las minutissimas pluviam distillavit Natu- A simi-
 ra, fertiliorem jucundiolemque longē, li.
 quā ubi gravius æther ingentibus nim-
 bis vasta colluvione terras inundat. Vel-
 ut peritus hortorum cultor viridarium
 aptè rigaturus, non in unum largumque
 sinum agglomeratas in hortum aquas de-
 rivat, ne unus, vel officiat totū exun-
 dans, vel parti deficiat exiguus; sed in
 plures discretam canales undam deducit,
 & multifidas riguo meatu venas distri-
 buit, & quot areolas, tessellas, ac pul-
 vinos, quot demum strias, ac liras, tot
 aquæ ductuum propagines ac diverticu-
 la prope infinita instruit, areolis rivulos,

A

ful-

fulcosque liris inter ponendo. Atqui studiosior culturæ suæ, ubi vel foli, vel cæli vitiô, fluentulum aut imbres denegentur, utriusque defectum curiosius supplet hydriis multiplici foramine imbriferis.

Unde pluit tenuis rivis rorantibus humor.

P. Alex.

Don. lib.

2. cap. 5.

Qualem, inquam, se se in Universo, plaufibili magis apparatu, qualem in hortis cultor, laudabili industria, talem, nec minori utilitate vel sapientiâ se se gessit Natura in rebus animalibus, ubi mirabilis opificii plena sunt omnia. Nimirum ubi cavitates aut canales, aut quæ cavitate vel canali continentur, aut fluunt, humectandi ad mollitiem, & cum mollitie, contenta ad dissolutionem, & fluxum, continentia ad flexibilitatem, lubricandi ad facilitatem diffluxus, obliniendi ad temperiem, ac munimentum acrimoniæ, ac impetûs, incumbit necessitas, vel suadet istorum, & qui ab hisce pendent, usuum oportunitas, utilitasque, nihil frequentius molita est Natura, quàm quo nihil sapientius poterat excogitari.

Ufus

Descriptio.

Nempe ad cavos parietes fonticulos excitat plures, scrobiculos exculpit, rivulos molitur, plurimos adeò, ut locus bellè irriguus ubertate fontium occurrat; ad

ad brevia invicem intervalla ita digestos, ac si ad exiguas quasque areolas sui aptarentur trepidanti venâ siphunculi; tenuiter adeò suaviterque lymphulas evolventes suas, ut humentia velut quandoque cryptarum tophina mollibus guttulis, flere cavitatum animalium parietes facilè putes; molliter adeò minutas rorant guttulas, & in cavitatem, velut in cratera reciproci miscent blandè cadentes liquores suos. Hîs mediis sapientissima rerum Natura ex ipsa glandularum & canaliculorum multiplicitate præclare sibi compendium efficit, operationibus suis facilitatem, promptitudinem, & perfectionem.

Cogita enim humectandam & obli-
niendam esse superficiem aliquantæ la-
titudinis per quod-velis liquidum. Cer-
tum est toti illi quaquaversum latitudi-
ni induci debere saltem humidam su-
perficiem velut humoris laminulam. Jam
id præstare tentato per liquidum, non
multiplici scaturigine minutim, sed ex
unico fonte uberiùs promanans: Putas
ne eâdem facilitate ac celeritate perdu-
cendum per latitudinem humectandæ
superficiæ liquidum uno fonte unoque
ex loco erumpens, ac in plures guttulas
ex multiplici scaturigine depluens? ne-

Ratio.

Ex ab-
surdita-
te oppo-
siti.

quaquam, si fapis; sed uno profluens rivo, vel totum implere cavum debere, si concavam, vel saltem abundantius profluere, si convexam planamve superficiem allambere debeat; utrinque frustraneum, aut super-abundans multisque modis incommodum in cavitatibus, quæ liquoris copiam, vel exterius apertæ concipere non possunt, nec debent, vel nimium sensiles non patiuntur, vel locum liquidis aliis aut solidis permissuræ, nequeant admittere, aut sine laxitatis aut nimix adjacentium compressionis periculo diutius detinere.

Aliter uno deductum stillicidio; vel perpendiculariter in cavum excidens, vel modicò oblique vagèque proserpens rivulò, exiguum sanè spatii alluendi pertingeret, pluraque saltem relinqueret velut in mari brevia, arentia penitus & exsucca, tantum-abest ut per universam perducatur superficiem, eamque exactius investiat, quod erat genuino operantis naturæ modo maximè consentaneum.

Quin etiam si abundantius foret glandulare liquidum nec id præstaret usuum quibus destinatur, in Cavis, quæ liquorem aliquem stimulandi aptum continentia mucosò interiùs oblinimentò muniri

niri debuerant : namque glandulæ rivulus liquori cavitate contento perfusus , eundem quodam-modo quidem mulceret , sed cavum parietem non obduceret : quare nec satis tutum probèque munitum erit a stimulo continens cavum , nec illæsum , & a permixtione sincerum , contentum liquidum , ut fieri maximè oportuisset.

At plures etiam fontes eosque dispersos , sed tractibus longioribus diffitos comminiscere : spatii resistentiâ fiet , non modò ut distantes difficiliùs , sed inæquali resistentiâ , etiam ut inæqualiter & imperfectiùs omnes superficiei partes obliniantur : siquidem vagè fluens liquidum ad has partes excidisset , ad has hæreret , ab illis substitisset , prout resistentiæ , hæque inæqualiter occurrentes permitterent , aut cohiberent : Unde non universa superficies , sed aliquæ solum ipsius partes humectarentur : Igitur multò difficiliùs ac inæqualiùs ageretur huiusmodi liquidum per spatia longis tractibus emetienda , seu majori labore veniret in humectationem & oblinimentum datæ superficiei.

Quare facilitatis semper & perfectionis numen Natura , & exactæ , & expeditæ cavitatum humectationis ac deli-

Neces-
sitas.

Quo-ad
Cava

nititionis studiosa, liquidum mulcens per-
ductura per universam superficiem ca-
nalis aut cavitatis, hoc utetur artificio:
quod est, totum spatium humectandi
corporis dividere in spatia plura & mi-
nora, & Glandulas in massulas plures &
minores, ut quocumque velis loco ob-
vius & paratus humor occurrat, & per
exiguum utrasque glandulas inter-jacens
spatium facilè agat se se; atque hunc in
modum habeatur expedita, & perfe-
cta humectatio, & oblinimentum illius
dati corporis & superficiei: quum per
hanc disgregationem, seu disjunctionem
fiat, ut liquidum intra breve temporis
spatium agi possit supra omnes hume-
ctandi corporis partes minimas, quod
intra spatium temporis multò, ac mul-
tò longius succedere non potuisset, non
diviso corpore in plura spatia, & glan-
dulis in plures massulas. Sed & est per-
fectior humectandi obliniendique modus,
reductâ humectandâ superficie velut in
aréolas, & inter brevía spatia meatu
frequenti constituto, perductôque affa-
tim liquidô: Ita enim fit, ut divisa illa
superficie in plura spatiola, & ad unum-
quodque spatiolum constituto latice, fit,
inquam, ut nulla pars datæ superficiei
effugere liquidum possit, & non hume-
ctari.

Quod

Quòd si in illo canali, aut cavitate ^{Quo-ad}
contentum emolliri, dissolvi, aut quo- ^{Con-}
quo modo debeat modificari, fiet qui- ^{tenta.}
dem ut per glandulas hujusmodi requi-
situm liquidum in cavitatem depluat,
ac deponatur eo modo, quo per unum
ductum fieri potuisset; sed insuper erit
peculiaris & aptior circa contenta liqui-
di agendi modus: persimilis admodum
operationi, quæ Chymicis stratificatio
nuncupatur. Nimirum velut illi ut cor-
pus aliquod difficiliùs solubile faciliùs
solvant, solvendum corpus in laminas
plures, & quò possunt tenuiores secant,
quas ita alias aliis super-struunt, ut duo
quotque solvendi corporis plana alterum
fermenti planum inter-mediet, sicque ex
solventis solvendique corporis stratis, al-
terna serie dispositis, aptissima operati-
oni chymicæ strues contignetur; ut fer-
mentum solvendo corpori copiosius per-
mixtum, minimas lamellarum altitudi-
nes utrinque, & facilè subeat, dissol-
vat, inmutetque. Ita in animalibus
glandulæ per longitudinem canalıs dige-
runtur, ac veluti stratificantur: nempe
inter duas quasque moles contenti cor-
poris constituitur glandula, & singulæ
moli contenti corporis suis accomoda-
tur siphunculus, ut, non totî massæ

confuse, & rudi quodam modo, sed partibus singillatim exactius immisceri, & suas agere operationes glandulare liquidum posset.

Ex copia.

Quoniam rursus partes quam-plurimæ liquidi copiam satis ingentem sibi, & operationibus suis exigunt, quæ si ab unica peti glandula debuisset, grandior illa, & quibus hæreret, aut adjaceret partibus, gravis & molesta nimium foret: velut si glandulæ Ventericulum aut intestina irrigantes in unum congestæ, glandulam constituissent Ventericulo, aut partibus vicinis affixam, grandior profectò quæ exurgeret moles, eidem partibusque vicinis negotium facefferet; quod in amplitudinem cavitatis, & canalis longitudinem distributis, planè est nullum.

Et facilitate liquidum emungendi.

Cum etiam cavitates assiduo madere liquore sit necessarium, ita comparatæ ad cavitatem esse glandulæ debuere, ut quolibet momento adesset præsto, & facilis flueret liquor; ubi potissimum nerveæ incurrens membranæ stimulus, sui obtundendi, membranæque leniendæ necessitatem fecerit; per Conglomeratas autem, utpote magis a tunica stimulata distantes, non statim adeò præsto esse liquidum potest, ut a Disgregatis, quæ vel in ipsa-met nervea tunica sunt insculptæ,

ptæ, aut saltem eidem immediatè subjēctæ, ut datâ vel minimâ nerveæ tunicæ vibratione, tensione, aut corrugatione, ipsæ agitentur comprimanturve glandulæ, vel saltem exigui concutiantur excretorii canaliculi, unde facilè deciduus proritetur humor ac sollicitetur, leviter provocatus e fistulis manet, nec guttīs impluat modò, sed repentinis quandoque torrentibûs influescat.

Rursum quum pleraque, sin omnia minùs, Cava adjacentes habeant Potentias seu advolutos villos contractiles, ut motus illa suos exerceant; compendiarial^{Expri-}_{mendi.} semper Natura voluit eâdem contractilitate (quæ alioquin erat necessaria) uti ad compressionem Glandularum. Dum Ventriculi, ex gr., ex *Malpighio* (a), & intestinorum, ex *Bohnio* (b), nervea interiorque tunica a Carnea in rugas insignes contracta assiduè detinetur, assidua compressione a subjectis unâ Glandulis liquor promulgetur, crescenteque identidem contractionis unâ & liquoris necessitate, uno eodemque momento, utrique fit satis.

Atque Hujusce generis glandulis quam
A 5 mini-

(a) *De Struct. Gland. ad Soc. Reg. Angl. Epist.*

(b) *Circ. Anat.-phys. Progymn. XXIX.*

minima sufficit potentia? utpote quarum planum totum plano fibroso, singulæ singulis fibris adjacent, aut ambiuntur, amplexanturve, quæ ex molli, cedente, facilimèque compressili loculo constant, quibus quàm parva per brevissimam Excretorii longitudinem resistentia? quum Glomeratæ & extra cavitationem sitæ proprias, & sibi invicem profundius inmixtæ, & Excretorio longiori præditæ, majores sibi potentias adscivissent. Nec addo quid compendii sit ex eo, quod Disgregatæ peculiaria sibi vasa sanguinea & spirituosâ non exigant, sed ea sibi accomodent quæ sunt nactæ partium adjacentium occasione.

Ex simplicitate.

Etenim verò nulla frequentior esse Glandularum structura, & dispositio potest, quàm quæ non modò, quo-ad operandum usibus aptior suis, non modò in exterioribus adjumentis, sed in suo-met machinamento simplicior. At quæ simplicior esse glandularum structura vel dispositio, quàm Disgregatarum potest? quibus structuram simplicissimam decrevit, Omnium decretò summus Naturæ Dictator *Malpighius* (a), atque illud facilè evincit, quod aliæ secre-

cre-

(a) *De Structura Glandul. &c.*

cretrices glandulæ in istas resolvantur , ita - ut quod in Conglomeratis non nisi longo labore attingimus intimam dissolventes texturam , ut folliculos glandulosos , quibûs Conglomerata compingitur , retegamus , in his statim occurrat , facilis res , nullius arduæ obscuræque compositionis , ut nullum majus structuræ compendium possit inveniri.

Patet itaque Glandularum Disgregatarum necessitas , ac utilitatum summa , ut pateat ratio cur Natura has structur-
 as in animalibus frequentius adhibuerit ; frequentius inquam in Cute universâ Mi-
 liares *Stenonis* , in Naribus , ut pridem attigerat *Schneiderus* (a) , & nuper diligentissimè descripsit Clarissimus *Vieussens* (b) ; in Aurium Aquæ-ductu & Meatu auditorio , quas elegantissimè delineavit Præclarissimus *Du Verney* (c) ; in Palato , Faucibus , basi Linguae , Epiglottide a Nic. *Stenone* (d) ; ad Trachæam (e) , & Oesophagum (f) à *Willisio* , ad Ven-

Disgre-
gata-
rum e-
nume-
ratione
Epilo-
gus.

tri-

(a) *De osse Cribrif. & sensu ac org. odor.*

(b) *De cereb. Cap. xvj.*

(c) *De Aud. org.*

(d) *Observat. Anat. de Gland. oris. &c.*

(e) *De respir. org. & usu Dissert.*

(f) *Prim. viar. descrip.*

triculum a *Wepfero* (a), ad Intestina a *Peyero* (b), detectas; ad Uterum, Pericardium, Pleuram, Peritonæum ex observatione *Malpighii* (c); ad interiorem tunicam Vesicæ biliaræ ex *Malpighio* (d), & Urinariæ ex Dan. *Tauvry* (e), nec non & Uretheris; in Arteriarum, Venarumque ex *Willisio* (f), fortè etiam Lymphæ-ductuum tunicis ex observationibus oculatissimi *Nuck* (g), millenisque aliis in partibus animalium, ut passim observant Anatomici.

Frequentissimo huic Glandularum populo propriam assignari Coloniam debere censerem, eamque amplissimam ab iis non uno seclusam discrimine, quibus tota glandularum universitas latioribus velut provinciis, alterâ in Conglobatas, alterâ in Conglomeratas dispescitur extensis magis finibus ambituque, a *Sylvio* primùm, indè communi Anatomicorum con-

(a) *Miscellan. curiosi Germ. observ. 251. An. 2.*
 & *Cicut. aquat. Hist.*

(b) *Exerc. de Gland. Intestin.*

(c) *Dissert. De utero & Vivip. ov. &*

(d) *De Struct. Gland. conglob. Ad Soc. Reg. Angl. Epist.*

(e) *Des usage. de la struct. de l'homme Chap. x.*

(f) *De respir. org.*

(g) *Adenograph. curios.*

consensu censita. Eòque humaniùs id mihi permissum iri confido , quod hanc quam instituo specialem glandularum divisionem , eo fine acceptam & cohonestatam velim, ut confusa alioquin moles glandularum universa in partes tribuatur, quarum unaquàque decenter contractâ, Disgre-
rite secretâ, prudenter digestâ , singulis gata-
suo donatis loco , suo dispositis ordine, rum a
Glandulare agmen eâ , qua nulla aptior cæteris
ad claritatem conciliandam methodus, seclufa
divisione videlicet ac distributione illu- Provin-
stretur. Neque enim exaratae modò gland- ciâ.
dulæ a Conglobatis & Conglomeratis minùs , quàm illæ inter se invicem disconveniunt , ut quemadmodum vulgò duplici, sic etiam triplici in glandulis diversarum proprietatum conventu, interven-
tuque scissa glandularum societas, tribùs æquè ac duabùs donari provinciis commodè possit.

Ecquis enim est qui glandulas istas velit e genere Conglobatarum ut Phil. *Ver-Corp.*
beyen Subcutaneas ? quum tanta sit is- *Hum.*
tis in exteriori forma, interiori structu- *Anat.*
ra, liquore , canali, officioque discre- *Tr. 1. 6.*
pantia. Aut quis inter Conglomeratas re- *VII.*
censeat ? quarum-met nomen plurium
glandularum in unam, plurium Excre-
toriorum in unum coeuntium collectio-
nem

De
Gland.
Struct.
ad Soc.
Reg.
Angl.

nem importat, ut istis quæ singulares omninò sunt, aptari minimè possit. Quamobrem cui magis quàm *Malpighio* assentiar est nemo, Qui licèt eâ quâ erat puriori, sincerâque intelligentiæ venâ Naturæ simplicitatem, cui erat apprimè factus, pressò sequutus gradu, inter glandulas omnes analogiam instituerit, tres tamen glandularum species agnoscit, & præter Conglobatas, ac Conglomeratas, tertias facit Miliares, quibus *Palatum, Oesophagus, Intestina, & consimiles partes copiosè ditantur.*

Disgre-
gata-
rum ple
rarum-
que
structu-
ra.

Hæ Disgregatæ seu Miliares glandulæ, aut earum saltem pleræque ex illarum sunt genere, quæ Vesiculares communiter appellantur ab Anatomicis. *Ex Wepféro quippe & Peyeró constat ventriculi & intestinorum glandulas, ex Malpighio Miliares omnes glanduloso folliculo seu cameratâ in vesiculam peculiari membrana, aptâ cribrationi peculiaris fluidi simplicissimè integrari.*

Th. Co-
va Jes.
Puer
Poem.
J. VI.

Hinc *Alexander Pascoli* qui Hetrusco sermone
*Qui Latii jam sæcula prisci,
Et Grajas venères fandi dulcedine vincit.*

miris eloquii modis, quibus scientiæ dulcescunt, leporem Charitesque omnes
Rei

Rei Anatomicæ invexit , suavi perfundens venâ.

Nectaris ætherii , longè super Attica mella.

Ut quæ Italiam , apud quam post barbara sæcula ita primùm est instaurata , ut in eâdem primùm nata videatur , in patriam agnoscit , patrio fermone Italiam se se (ut cæteræ scientiæ) ostentaret Anatomes. *Alexander* inquam *Pascoli* *Il Corp.* (qui non ingrati hujusce digressionis *Uml. 1.* occasionem fecit) ad rem nostram aptis- *part I.* *Cap.* *Ma degno di rimarco si è in co-* *XIII.* *teste ultime* (idest vescicolari) *che il sangue , e gli spiriti animali , di mano in mano , che bagnano le pareti delle vescicole componenti , vi depongono un certo licore particolare ; il quale gemendo nelle loro minutissime cavità , ivi insensibilmente si accoglie , per poscia trapelare in alcuni canaletti insensibili.*

Namque peculiaris structuræ membrana illa , qua Miliare excitantur in plerisque , fin omnibus , Animalium partibus in planum extensa non fuit , ita ut *Struc-* Intestinorum ex. gr. aut Urethræ interi- *turæ ra-* or paries vel totus , vel debitis interval- *tio.* lis , ipsa esset glandulæ substantia , ipsaque eorum cavitas , communis excretorii canalis loco esset , ut intende-
ro

re videntur quoad Intestina *Glissonius*,
 quoad Urethram *Diemerbroeckius*,
 utque fieri facile potuisset, & fortè eti-
 am in partibus aliquibus factum; puta
 in Pleura, Peritonæo & consimilibus.
 Neque id quidem incongruum, si fo-
 ret: ubi tenuissimus, exiguusque li-
 quor, seu velut mador perspirationis
 instar continuò sufficitur, atque ubi
 membranam illam nihil incurfat, aut su-
 per-excurrit naturaliter, quo deteri, ob-
 strui, vel quo-modo-libet lædi glandu-
 laris textura faciliùs possit; quòd tamen
 quum in locis animalium plerisque gra-
 viùs timendum foret, nec-non aliqua
 continuò, majorque identidem liquidi
 copia exigeretur, nec superficialiter tan-
 tùm excavatæ, nec granuli in modum
 solidæ atque compactæ, vel nullo vel
 exiguo præditæ conceptaculo apponi
 glandulæ debuere, ex quibus (nihil vel
 sanè parum liquidi concipientibus) sta-
 tim a secretorio in locum depositionis
 suæ, in Urethram puta, vel Intestina,
 continuò vel nimis exiguum vel extem-
 poraneum deplueret liquidum; sed in
 marsupiolum velut efformatæ, quæ
 plusculum liquidi concipiant, ac velut
 in gurgustiole servant tantisper, debitis
 temporibûs, aptæque ad exigentias quan-
 titate

titate erogandum. Quin etiam per factas in cavernula morulas, inspissari aliquantulum cogique liquor poterit, & gluten assumere, quo partibus lubricandis hæreat magis, easque melius obducatur, quod in glandulis vesiculosis passim observamus.

Est ut hæc Glandulas alibi majores, alibi minores, alibi magis strigosas, alibi corpulentiores observes, quæ partem ex superioribus; alibi etiam magis, alibi minus diffitas, alias in racemum collectas, aut confertius saltem stipatas, ubi nimirum ad singulas canalis aut cavitatis sectiones minus, magis ad aliquem tractum est liquidi & quidem majoris necessitas; ut in tenuibus Intestinis, orificio Vesicæ urinariæ & consimilibus.

Quemadmodum ad Glandulas Conglomeratas; ita etiam ad Disgregatas; non plura modò, ac multiplicia vasa, quantum vitalitati, nutritioni, ac secretioni est necessarium; distribuuntur, sed eò insuper artificiò propagantur, ut statim ac extimam tum Disgregatarum, tum arctè Conglomeratarum superficiem attingunt, in multiplices primum ramulos dividantur, indeque admirabili quodam modo implicita, & sibi millies ocellis

currentia , velut reticulatum opus constitutant , innumeras maculas & mille continens retia , quò debitis ad munii exigentiam circulationis motibus fluat , æquīs partitum portionibus in singulas glandulas distribuatur sanguineum liquidum , nec-non *conservetur & promoveatur solutio generalis liquidorum , & separatio liquidi a liquido in Glandulis absque Fermento* , maximè verò ut liquoris secretionem , & derivationem tum intrinsecâ , tum extrinsecâ compressione sollicitent.

Laur.
Beilini.
Opusc.
de Fer-
ment. &
Gland.
Prop.
XXXVI.

Qua ratione præfertim ad Disgregatas.
In Conglomeratis reticulares texturæ glandulosum viscus altè subeunt excurruntque , rimulas omnes penetrando , intimèque subdivisiones Visceris omnes amplexando : Quum ad Disgregatas reticulariter quidem implicentur , sed in planum extensæ & membranulis colligatæ veluti propriam sibi tunicam adsciscant , vasculosamque provinciam , ita dixerim , efforment. Idem inquam est artificium in Disgregatarum , ac in Conglomeratarum textibus vasculosis , licet dispositio planè diversa , quâ glandularum suarum dispositioni concinnatur : ut ubi sibi invicem super aggestæ agglomerantur Glandulæ , multiplices quoque super-impositi invicem agglomerentur reticuli ;

culi ; ubi discontinuatæ in eodem plano locantur Glandulæ , in planum ipsi quoque extendantur vasculares reticuli ; Quorum usus & emolumenta quoad Glandulas tum Disgregatas , tum Conglomeratas , in utroque utriusque generis Urethræ Glandularum Capite inferiùs velut præsentè exemplo , longè aptiori locò , meliùsque ad captum exponere saltem incipiam.

Neque hic adducam necessitatem Musculi supra Glandulam vigentis, quod præstabo inferius, vel compendium planè Musculosi plano Glanduloso in Canaliculis & Cavitatibus super-extensi, quod præstitum supra.

Cap. IV.

Pag. 10.

C A P U T II.

De Glandulis Disgregatis Urethræ.

Disgre-
gata
rum ad
Uret-
hram
necessi-
tas.

QUæ in partibus supra, cursimque recensitis, ad Urethram quoque incubuit humectationis, lubricationis, & munimenti necessitas. Nimirum Urethræ interior tunica, utpote admodum tenuis, quum vasculis sanguineis non modò suis irrigetur multis, sed èt plurimis tunicam Urethræ mediam contextentibus ambiatur, ex quibus calore assiduè, atque in tentigine potissimum affatim perspirante, siccitate rigere, scabrescere, corrugari, angustarique facilimè ad plura incommoda posset: Quorum alterum facilè eveniturum puta, quòd quemadmodum vola manus exsiccata molestè extenditur, atque plicatur, & contrectationes molestè exercet, sic Urethræ interior tunica exsiccata moleste elongaretur atque contraheretur rigentibus villis, & præterfluum excernendorum incursum duriter exciperet; quare ut vola manus non modo facile movetur, sed èt voluptuosè agitatur, liquore a Glandulis miliaribus erumpente emollita, sic mollis liquore suo Urethra

Ad con-
tractili-
tatem,
& distra-
ctilita-
tem ca-
nalis.

mo-

motibus exteriùs adjacentium facilè obtemperat, intrò-fluentium non modò sine molestia, sed etiam cum oblectamento agitari est apta.

Quoniam rursum quæ fluere per Urethram debent duplicis potissimum generis liquida, urinosum, atque semineum, eorumque præcipuè alterum, ut celerius fluant necesse est: hinc non fluore solùm aliquo humectata ab asperitate caveri Urethra, sed etiam ad minuendas occursum resistentias unguinoso humore debuit lævigari, ad excernendorum facilitatem, feminisque potissimum, quod per lubricum Urethræ missile velociùs exiliat, fæcundationis, & voluptuosæ affectionis necessitas exigebat.

Denique quoniam liquida per Urethram fluentia stimulo quoque suo ac impetu sunt prædita, præcipuè quæ frequentius canalem istum excurrit, urina; acriùs vexari, uri, excoriarique Urethra posset: nisi viscidò tanquam vernice illita fuisset ac loricata.

Uliginosum, istud quo Urethra humectatur, inungitur, atque munitur, omnes agnoverunt Anatomici; Ejusque duplicem ex assignatis necessitatem agnovit Galenus: *Nam si totum spatium, l. 2. de Fauces, & Gulam, si item universa sem. Cap. 6. In.*

Intestina Glandulæ irrigant, quid mirum esse debet, quòd collo etiam Vesicæ tale quoddam subsidium præparatum fuerit, ne exsiccatum ad motiones torpidum redderetur? Peni verò marium multò etiam magis fuisse a Natura hoc adjunctum remedium credendum est. Hic enim in maribus magnitudine etiam conspicuæ Glandulæ sunt: quippe quum periculum esset, ne, quum prælongus his ac nudus Penis extet, exsiccatus vel distorqueretur, vel meatu occluso conniveret. Et infra: Quamquam potest fortasse Natura, ut urinæ morsioni occurreret, talem humorem ad Colis meatum levigandum præparasse. Ac vaticinanti similis: Fortasse etiam, si quis diligentius specularetur, tertiam aliquam causam inveniret. Immo plures ob hujusce humoris oleosi defectum difficultatibus in utraque per Urethram excretionem vexatos observat Jo: Riolanus (a).

Quo autem fonte prodeat hoc liquidum nondum certò constat. Ab Astitibus glandosis petebat citatò locò Galenus, & cum Galeno Th. Bartholinus (b), Petr; Dionis (c). Eandem certè sententiam,

(a) *Enchyr Anat. pathol lib 2. c. 36.*

(b) *Anat. lib. 1. c. 23.*

(c) *Anat. demonstr. IV.*

tiam, sed aliquatenus, diversôque modô discrepantem partim sequuti, partem commenti sunt Andr. *Laurentius* (a), Jo: *Riolanus* (b), Anton. *Everardus*, Th. *Warthonus* (c). A Vesiculis feminariis Nath. *Highmorus*, ut refert *Diemerbroeckius*, qui in eadem sententia malè *Galenum* citat, meliùs de *Riolano* dubitasset.

At verò Isbr. *De Diemerbroeck* (d) ab ipsa-met Urethræ substantia derivat his verbis: *Et lubricitatem Urethræ non ab aliquo oleaginoso humore e dictis vesiculis effluente, sed aliunde oriri, scilicet ex nutrimenti Urethræ aliqua parte mucida, qua interior illa via oblitur, sicut etiam lubricitas Vesicæ urinariæ, Intestinis, aliisque variis partibus hac de causa contingit.*

Non puto esse cur sententiam liqui-
dum Urethram mulcens a Vesiculis fe-
minariis deducentem longius impugne-
mus; quum satis omnibus constet in A-
nimalium multis feminales vesiculas vel
deesse naturâ, vel exsuccas adesse castra-
B 4 tione

Liqui-
dum
Ure-
thram
inun-
gens
non a
Vesicu-
lis Se-
mina-
riis.

(a) *Hist. Anat. de Car. musc. l. v. quest. xi.* &
De Part. gener. dic. l. vii. c. vi.

(b) *Cap. supra-cit.*

(c) *lib. De Gland. c. 31.*

(d) *Anat. l. i. c. xxi.*

tionē : nihilo tamen minus in his æquē ac in aliis Urethram humore deliniri ; ut semineo liquore maderet Urethra , continuum ejusdem in illam defluxum necessarium fore : quum tamen omnes pueritia , aliquos castimonia , multos temperantia , animalia omnia structuræ (ab apposita præcipuè Caruncula) seu velis Naturæ necessitas , vel diu , vel semper , vel aliquandiu a feminis effluxione coerceat ; humorem quo Urethra lenitur ab illo vesicularum multum differre ; prodigam nimis fore Naturam , quæ tam pretioso liquore , ad necessariam Venerem defuturo , nimis abuteretur ad linimentum Urethræ , velut qui balsama pretiosissima ad inungendum profunderet , ut illi quondam elumbatæ magis molliciei homines , & voluptuosorum proceres balsamis ex ultima Arabia deportatis caput totumque corpus inungebant , ut prodigialiter prodigi ad plenum luxuriæ parentarentur.

Non a
Proté-
flatis.

Quoad succum verò Prostatarum patet illas alto in recessu conditas , ab Urethræ extremo nimium dissitas fore , neque ab illis suppeditatum liquidum per totam æqualiter , & perfectè Urethram perducī , eamque obducere commodè posse , qualiter usum mox enarratorum fo-

solemnis in Naturæ operationibus perfectio exigebat, ut liquet ex superiùs (a) adductis incommodis in canali aut cavitare per liquidum ex uno fonte, nec per totam canalis aut cavitatis internam superficiem multiplicato erumpens obliniendâ. Denique ductuum Prostatarum orificia exiguis quibusdam carunculis obturari omnes consentiunt Anatomici, quibûs certè ne continuus sit liquoris Prostatarum effluxus satis cavetur, nec nisi superaddita vi Prostata contringente, superabitur papillarum resistantia, exitusque permittetur.

Neque ab ipsa Urethræ substantia; Non ab cum secretiones omnes moliri per Glandulas Natura consueverit, & nihil alioquin peculiaris texturæ habeat Urethræ interior substantia, quo facere ad secretionem possit. Fortè idem *Diemerbroeckio* quoad rem præsentem dici posset, quod *Glissonio* (b), mucum intestinale ab intestinalis tunicæ parenchymate deducendi, Jo: Jac: *Harderus* (c); nempe quòd si nomine substantiæ seu parenchymatis interioris tunicæ Glandulas quoque intelligat, sententiam non rejecerim.

B 5

Nul

(a) Cap. I.

(b) De Ventric. & Intest.

(c) Epist. ad Peyer.

Nullus verò rem meliùs odoratus est, quàm ad miraculum usque sagax, & industrius genitalium disector Regn. *De Graaf: Tertia opinio eorum, qui in corpore glandoso humorem gigni, vel excerni arbitrantur, ea-tenus quidem non errant; sed dum illum primariò ad obli- niendas, & humectandas vias urinarias factum volunt, nostro judicio erroris sunt arguendi; cum ad hoc non require- retur tantus apparatus, utpote cum in- numerabiles viæ, quæ per totum Ure- thræ ductum, præsertim in Vitulis ali- isque animalibus grandioribus, conspi- ciuntur, ad humectandam Urethram sa- tis multum liquoris possint adferre.*

Non ab
incertis
Graaffii
viis nisi
sint no-
Et quidem postquam Glandulas Ure- thræ Disgregatas detexi, cùm in hunc *Graaffii* locum inciderem gestiebam sum- mopere tenues labores meos indefesso Genitalium Scrutatori jam pridem pla- cuisse. Antequam verò illas detexissem (meam vel in legendo incuriam, vel ad intelligendum habitudinem fateri inge- nuè lubet) quamquam sæpe meis versa- retur manibus *Graaffius*, nunquam in citato textu moratus fueram, aut quid- quam affulsit mihi, quo rem istam agno- scerem, sed neque ut tentarem. Atqui eâdem

eâdem (quâ ego) incuriâ culpandi essent quotquot de Urethra post *Graaffium* scripsere Anatomici undequaque exactissimi, nisi meam antehac, auctorumque inobservantiam excusaret ipsa *Graaffiani* textus manca, & obscura expositio, quæ quid sint hæ innumerabiles viæ, aut unde prodeant, an glandularum excretoria sint, vel meri membranæ pori, & an in homine, quove modo se habeant, minimè certò declarat, ut rem ferio tractanti opus fuisset; ut clarè constet id imperfectum adeò & anceps a *Graaffio*, ut ferè intactum videatur. Hæc sanè ex illorum sunt genere, quæ postquam curiosa cadaverum sectione didicimus, in Authoribus agnoscimus, quorum lectione contentos semper latuissent velut sepulta, aut nondum huc-usque comperta. Quidquid sit tantum abest ut susceptam provinciam velut alienam deponendam, quin potius ineundam alacriùs censeam; eo-met ipso quòd *Graaffius* tametsi lucem mihi non attulerit, saltem eximium nunc addat instituto nostro robur & firmamentum.

Profectò licèt de Glandulosa Intestinorum structura jam ante scripsisset
Franc.

Franc. *Glissonius* (a), Oliger. *Jacobæus* (b), Jo: *Swammerdam* (c), Marcell. *Malpighius* (d), & Casp. *Bartholinus* (e) in extis leporinis; nihilo tamen minùs Accuratissimus *Peyerus* Jure omni, & universali plausu Glandularum Intestinalium inventor cluet. Neque hoc affectando Inventoris nomini dictum putes, quippe hùc animo dissimulare *Graaffii* locum facilè potuissem, sed agere candidiùs volui, æquiùs aliorum candori judicium relicturus,

Adjungeret fortè hùc quispiam Hieronymum *Barbatum* (f), velut qui agnovērit *albescentes ductus ad Glandem usque sub Urethræ tunicam expansos*. At verò ab Ejusdem textu patet quàm longè a re nostra, & veritate distet *Barbatus*, qui pag. 40. *quot verba tot figmenta proponit*, ut verbis utar Casp. *Bartholini* (g): *Prostatarum radices* (inquit *Barbatus*) *ab Arteriis nascuntur per corpus Penis expansis, unctuosam non extravasati sanguinis humiditatem intra Prostatarum cavitatem adducentes, quæ*

mus-

(a) *Lib. de Gul. Ventr. & Intest.*

(b) *Act. Med. Th. Bartholini Vol. 3. Obs. 64.*

(c) *Figur. à Th. Bartholino communicatæ.*

(d) *Epist. ad Jac. Ruffum.*

(e) *Act. Med. Hafn. Vol. 1. Obs. 136.*

(f) *In Dissert. Anat. de Format. Organiz., & Concep. &c.* (g) *Epist. ad Ger. Blasium.*

musculorum super-impositorum compres-
sione in alios pellitur albescentes ductus
ad Glandem usque sub Urethræ tuni-
cam expansos, rotundasque Penis dein
innumerabiles ingreditur fibras, ubi ca-
lore arteriarum fit tenuior, sicque ve-
nereis imaginationibus, cognitionibus,
aut delectabili contactu accendatur san-
guis, extenuatur magis fibrillarum hu-
mor, ac vertitur in flatus, quibus eri-
gitur, tenditurque Colis &c. unde patet
non modò quàm fictitius ineptusque, sed
etiam quàm alienus a Re nostra *Barba-
tus* fiet; utpote qui (quantùm conjectu-
râ assequor) pro canalibus Prostatarum
assumpserit albos illos tractus, quibûs
interna Urethræ facies picturatur.

Quoniam igitur istud Urethræ linimen-
tum, vel nullum, vel sanè insufficiens <sup>Prosta-
tis sup-
plemen-
to addi-
tæ.</sup>
dari a Prostatis potest: earum itaque vel
supplementi, vel adjumenti loco, Gland-
ulas alias extruere opus Naturæ fuit,
nostrum inquirere; eandem rationem &
modum illa adhibens, nos comperientes,
ac Pancreati Peyerianæ, Conglomeratis <sup>Disgre-
gatæ.</sup>
salivalibus ad Labia, Palatum & Fauces,
minores Disgregatæque aliæ fuerunt su-
per-addendæ, tanquam asseclæ, aut sal-
tem affines. Quàmque affines sint cum
Prostatis Disgregatæ nostræ, patet in
Brutis

Brutis illis, quorum Penis est magis nervosus & tendinis in morem rigidior ut Bovi, Cervo, Capro, aut Hirco, Arie-
te, aut Vervece, Porco &c. Prostatae non in unum corpus glandosum coadunantur; sed pluribus singulatim distributis, seriatimque dispositis Glandulis ad normam illarum, quas Urethrae Disgregatas apello, simplicius efformantur.

Porro Brutis hujusce generis, utcumque grandioribus (quidquid dicat citatus * supra Graaffius) Disgregatae nostrae non adeo conspicuae pro longitudine Urethrae apparent. Quin ipsa etiam in Urethra Equina, ubi spectabiles maximè Glandulas mihi promittebam, mirabar exiguas adeo, ut primò vix, inde tantum, dari possem asserere: Fortè quòd minùs aptae ad hanc observationem nobis occurrerint Urethrae; sed fortè etiam quòd hisce animalibus, utpote Herbivoris, minùs sit acris urina, nec non aliquantulum glutinosa, in Equino potissimum genere; cui ideò ad Penis & Urethrae proportionem minores sunt, quàm in reliquis animalibus supra notatis: in Porco autem contraria de ratione magis, quàm in reliquis ex hoc genere animalibus, manifestae. At verò quibus Penis est osseus, ut Cani,
Vul-

* pag.

mea. 39.

Disgre-
gatae in
Bruto-
rum U-
rethra.

Vulpi, Lupo, Urso, Leoni & consimilibus, cùm animalia sint Carnivora, salibus ab alimento eliquatis onustam magis acrioremque urinam emittentia, conspicuæ aliquantulum magis, quàm in supra-citatis Glandulæ se se produnt. Nulli verò magis quàm Homini insignes adsunt, quum ejusdem, ut Vini-poto-^{In Hu-}ris, magis quàm reliquorum animalium, ^{mana.}urina armoniaco sale præpolleat, sola donetur Philosophico, *Jungkenii* sententiâ, magisque adurente stimulo acuatur, ^{Med.} ^{præs.fac.} majoremque faciat munimenti necessita-^{accomod.}tem. Hinc Muliebri quidem Urethræ ^{part. 3.}ad proportionem brevitatis suæ satis pa-^{In Mu-}tentes occurrunt ductuli a subjecto glan-^{liebri.}dulari corpore producti, non illi modò, quos *in principio Urethræ, & in inferiori antica Vaginæ parte observat, in inferiori parte, prope Meatus urinarii exitum* collocat, & *Lacunas* appellat ^{De Mu-}*Graaf*, quosque solummodo descri-^{lier.Org.}bunt vulgò Anatomici; sed alii in-^{gen.in-}super, exigui licèt, in ipso-met ^{serv. De}urinario ^{Meat.}meatu satis aperti. Virilis autem Ure-^{urin.}thra, utpote longior, & officio, præter urinæ excretionem, digniori speciatim dicata, canalium & Glandularum segete lætiori ditatur, nostramque ideò tractationem istam ad se præcipuè convertit.

Etc-

In Viri-
li.

Descri-
ptio.

Etenim-verò sꝑ longa sectione , per longitudinem quam velis, Urethram aperias, totam primò faciem ejusdem internam viscido fluore uliginosam , lubricamque statim observas: plurimis ac tenuissimis canaliculis huc illucque micantibus totam penè scaturiginosam nullo labore conspectas; detractâque interiori tunicâ nerveâ, eidem subjecti, corporique urethræ spongioso altius insculpti emergunt orbiculi subrotundi; unde vascula excretoria prædicti prodeunt canaliculi liquorem seroso-viscidum tenui gutture funditantes.

Varie-
tas in
multi-
tudine.

Atqui quod in Anatomicis occurrit solemniter , non in Urethris omnibus æqualem tubulorum & glandularum magnitudinem, numerumque comperies: In aliquibus plures occurrent, in aliis pauciores; semper tamen satis, aptèque ad necessitates suas: In aliquibus pauciores sunt sed majores, in aliis minores, sed proportionaliter multiplicantur; ut nusquam iniquam agnoscas omnium Parentem & Arbitram, quæ suarum studiosa partium ubi in multitudine defuit, magnitudine adauctâ compensat, profusiorrem verò multitudinis alicubi munificentiam, debitâ magnitudinis detractiōe contemperat.

Quin

Quin velut exsecto Pancreate in Ca- ^{In mag-}
 nibus tum Glandulæ, tum liquoris pan- ^{nitudi-}
 creatici defectum solito copiosiori lym- ^{ne.}
 phæ a glandulis intestinalibus, tum ma-
 gis tumentibus, affusione ordinario
 compensari observat *Brunnerus*, sic ^{Expe-}
 nunquam magis conspicuæ fiunt, suc- ^{rim. nov.}
 cumque copiosius, ultroque Urethræ ^{circa.}
 suppeditant Glandulæ Disgregatæ, quam ^{Panct.}
 ubi exiguas admodum esse ad Urethræ
 basim Conglomeratas contingit.

Neque æqualis semper aut similis om- ^{In Li-}
 nino est in Urethris omnibus ab hisce ^{quore:}
 Glandulis liquor: quandoque enim illa est
 uliginis hujusce copia, ut cænosa velut
 ac lutulenta videatur Urethra. Licet e-
 tiam seroso-viscidiusculum sit & albe-
 scens liquidum, sæpè tamen, quoad
 consistentiam, mox disfluxile magis ad
 serosum; mox hærens magis ad mucila-
 gineum; quoad colorem, mox ad dia-
 phanum, mox ad pallidum; mox ad
 subluteolum, magis accedit, & multi-
 plices varietates assumit, prout est li-
 quorum, a quibus secedit, & glandula-
 rum, atque canalium, per quos secer-
 nitur, ac fluit, major, aut minor a na-
 turali inmutatio.

Orbiculorum vel (ut organa secretio- ^{Glandu-}
 ni destinata appellare consuevimus) glan- ^{rum.}
 dula- ^{Habitu-}
 do.

dularum, saltem plerarumque magnitudo exigua adeò, ut ægrè conspicuæ fiant: substantia mollis & facilè concidens, ut si paululùm contrectentur exinanitæ collabantur, ac ferè dispareant: figura ad orbicularem multùm accedens; copiosiori namque liquore turgidæ quandoque in subrotundum tument, succi autem copia quandoque minori in lenticularem jacent.

Stru-
ctura.

Structurâ vesiculares utriculo constant membranoso tenui, cavitatulâ prædito, qui se se angustando guttulum suum efformat, & sensim exilesceat meatum producit, ac per nervosam Urethræ tunicam transversum agit, figurâ conicum, cujus latæ basis loco ipsa est glandula, apex in Urethræ cavitatem hiatus.

Vid.
Fig. I.
lit. ooo.

Plerique discriminati invicem glandulosi folliculi suum sibi canaliculum singulatim efformant, aliàs verò aliquot unà colligantur, canalesque magis conspicuos emittunt, ordinariò duorum numero vel trium, sed rariùs in Urethræ Cavernulam aut prope saltem hiscentes.

Com-
positio
Disgre-
gatarum
majorum.

Quo autem modo hæc glandularum collectio fiat, nempe an per multiplices glandulas ad mutuuum contactum in eodem plano coadunatas, & velut in legionem congregatas, singulas suis prædi-
tas

tas excretoriis singularibus in cavum aliquod aut utrinque apertum, aut cæcale hiantibus, quem-admodum tenuium intestinorum Racemosæ, aut ad Cæcum glandulæ confertissimæ; an verò per glandulas plures velut in racemum collectæ, aliæque aliis superstratæ, & in idem excretorium patentes veluti quæ verè appellantur Conglomeratæ; propter rei exiguitatem nihil certi deprehendere potui, propter debitum scribenti candorem, nihil auderem asserere. Si tamen datur sententiæ meæ locus coadunatæ potius esse quàm verè conglomeratæ videntur. Profectò si mei me oculi non fallunt penitus, non unus ad grandioris canalis extremum grandior folliculus, aut granulorum glandularium massa, sed ejusdem fundus pluribus insculptus utriculis apparet manifestò.

Postquam *Galenus* a necessitate glandularum ad Intestina necessitatem Prostatarum ad Urethram deduxit: Postquam *Jo: Fantonus* (quem propter præclarum animi candorem non minùs, quam plusquam singularem in rebus anatomicis & medicis eruditionem, non ingenuo minùs amore, quàm debitâ observantiâ amicum prosequor) in *Dissertationibus Anatomicis* quas tanta cum sui gloria, tanta

Supra.
cit. lib.
II. de
Sem.
cap. VI.

Dissert.
VI. P.
181.

cum Orbis utilitate Publico nuper concessit: postquam (inquam) Egregius Vir *analogiam instituit inter canalem intestinalem, & urethram, inter glandulas potissimum lenticulares intestinales, & glandulas prostates: & quem intestinales in intestinis, prostates in urethra usum præstare sapientissimè censuit: liceat mihi lumine a Galeno, exemplo a Fantono excepto, eandem comparationem proseguere atque provehere, & majori similitudine analogiam confirmare, atque etiam augere.*

Glandulae
Urethrales
Intestinalibus
Analogae.

Inter utramque igitur fistularum quæ egerendis potissimum excrementis dicantur, nimirum inter canalem (sic appellare liceat) fæcalem, & urinarium analogiam instituo, inter glandulas Intestinalium lenticulares, & Disgregatas Urethrae. Persimilis quippe omnino utrarumque, dispari licet mole, structura, figura, & consistentia; quibûs sanè qualitatibus non Racemosis minùs quam Lenticularibus Intestinalium sunt comparandæ: quum nulla sit Racemosas inter & Lenticulares quo-ad structuram usumve diversitas, sed in hoc uno tota, quòd (uti in Gallinaceorum Bulbo ventriculi *Peyeriano* molendinariae machina) sic illas in tenuibus intestinis aliqua peculiaris

ris utilitas instar manipulorum congeffit, quas libera & simplex Intestina oblinientis, contentaque modificantis liquidi supeditandi necessitas, velut in Crassis, sic in reliquis nullo vetante aprissimè disgregasset.

Quod utilissimum in crassis intestinis, ^{Utrobique Se-} etiam in Urethra fuit, ut non civiles seu ^{gregatæ.} in aggeriem collectæ, sed inciviles five segregatæ invicem fuerint glandulæ, ne alicubi justo magis cumulatis, alibi longiorique ad-modum tractui denegatis, inæqualiter nimium hùmectaretur Urethra, majorique illic excessu, illic defectu liquidi, ubique detrimentum proveniret: quum e contra singilatim dispositis, sejunctisque ad brevia intervalla laticibus riguo debita proportionè distributo tota gaudeat Urethra.

Quod ut promptis quaquaversum emis- ^{Inordi-} sionibus fœliciùs contingeret, non dis- ^{nata.} gregatim modò, sed & temere velut sparsa & vaga meatuum turba disponitur: neque enim ullum in situ suo ordinem exactè servant; nisi regulæ cujusdam loco habeas, quòd seriatim ferè, & parallelè disponantur, tum inter se invicem tum ad albam lineolam, quâ Urethræ concavitas per mediam longitudinem dirimitur: quod tamen rigorosè sumen-

dum non est, cum aliqui ab instituta ferie exorbitent passim tum in ipsa-met linea, vel propius ad ipsam, vel remotius assurgentes. Quæ sanè temeraria velut dispositio quanti sit consilii, patet ex pluribus in omni Disgregatarum genere hujus positionis exemplis, quanti verò emolumentum, ex iis quæ de Glandulis Disgregatis in genere diximus supra.

[Exemplum a murariis.

Nempe quo tectorum, persimili animalium machinatrix scientia usa videtur artificio: velut illa lateres non in directam perpendiculariter seriem superponit, seu non ita ut later lateri quoad ambitum congruat, sed ita alternè ut perpendicularis linea contactus duorum Laterum bifariam secet laterem succedentem, cujus longitudo superponatur duplici subjectorum Laterum semi-longitudini; ita hæc tum in locis plerisque, tum maximè in Intestinis & Urethrâ glandulas, earumque canales non in rectas series inter se parallelas, sed alternè disposuit ita ut spatium inter duas glandulas vacuo respondeat, sive superlocetur glandula: Et velut Illa expositâ dispositione ligatis invicem Lateribus validissimæ resistantiæ moles diuturnas solidat, quas per series perpendiculares, & mutuò parallelas invicemque dis-

jun-

junctas extruxisset evanidas, raras, brevique casuras; sic Ista spatiis intra glandulas alterno ordine occupatis totam debite, ut plurima etiam cava, implet Urethram, & unicuique ejusdem parti glandulam & canalem adaptat suum. Quod si glandulæ in series sibi invicem parallelas fuissent dispositæ & plures eformari glandulas, aut series sibi invicem proximiores instrui opus fuisset Urethrâ non æquabili aliter irroratione ditandâ.

Quæ itaque inordinatæ & velut dis-
jectæ per incuriam primâ fronte videbantur, glandulæ non tales verè sunt, sed alternè maximâque curâ dispositæ, aptâ etiam ad hoc diversitate magnitudinis: quâ tum glandulæ tum canales inæquales occurrunt, hique tum diametro tum longitudine, atque aliqui exigui adeò sunt & breves, ut parvulò unicè se se prodant ostiolò.

Et inæquales.

Consimili quoque ratione ut locis suis proportionalis sit, inæqualis est canaliculorum distributio. Et quidem velut *Duodeno ac Fejuno Pancreas fermenti affatim subministrat, ut plures ibi glandulas non requiri putet Peyerus*; ita & institutæ analogiæ, & Disgregatarum Urethræ Glandularum usibus minimè dissentaneum videbitur quòd aliquis

Ad Canalis

Principium

vel nullæ.

Epist.

IX. ad

Mural-

tum.

vel pau-

cæ.

quis a Prostatitis urinarii canalis tractus propositis glandulis vacuus sit & immunis.

Infra
canales
Con-
gloine-
ratarum
precipi-
ue ad-
sunt.

Cap. III.

Primò itaque paulo supra Urethræ medium, ibi loci ubi primùm illa emicat a Perinæo, duo primùm Canales majores emergunt, quos unà cum glandulis suis Conglomeratis descripturi sumus inferiùs. Hic primò ex Disgregatarum ductibus solitarium aliquem observabis in ipsa met area, vel peninsula, quam exarandi mox ductus majores eformant, intercipiuntque: postmodum verò emergere ductus incipiunt prope Eorum exitum.

Majori
illic ne-
cessitati.

Quoniam autem infra exarandi Conglomeratarum Canales sufficientem liquoris copiam effundunt; hinc prope eosdem, non multos extrui ductus necessarium fuit: quò verò aliquantulum receditur copiosiores: quare non magna circa Canaliculorum Majusculorum exitum meatuum copia, major circa Urethræ medium, plusque adhuc quò magis ad Urethræ extremum acceditur.

Ut in
Crassis
Intelli-
nis
Sic ad
Ure-
thræ ca-
vernula-
tam ma-
jores.

Velut in crassis intestinis ab excrementorum duritiæ ac asperitate molestæ confricationis ac etiam lacerationis periculum in nervea tunica, affixæ in eorum ductu glandulæ succum glutinosum co-
pio-

piofius suppeditantes providè impediunt præcaventque, sic etiam glandulis numerosius sobolescentibus ditatur, inungiturque copiofius ad Cavernulam Urethra, ubi acrior aliquantulum urina, femineum aut putridum quidpiam hærrere, acriterque exurere facilius potest.

Atqui velut glandulis intestinorum aliæ ad podicem succenturiantur, quales *marsupiorum exilium specie apud Josephum Duverney in Hyæna odori-fera*, indèque in homine fimiles *Graaf-fianis Lacunas* observavit Conrad. *Peyers*: ita ad extremum Urethræ, ipsumque Glandis osculum, & quæ osculi labella inferius committuntur, & Frænuli ligulæ colligantur, e vix sensili, longotamen tubulò ostiolum curiosè aperitur, suum eructulans liquidum; quod ni factum Glandis osculum utpote acri magis expositum, facilius exsiccatum corrugaretur, ac conniveret, aut exquisitissimi utpote sensus ustulatum sæpius indolesceret.

Ut autem & Glandulæ, & quæcumque huc-usque exposuimus melius pateant, placeat Tibi interiori tunicâ Urethram deglubere. Nerveam internam

C 5

interioris tunicæ lamella locantur.

mem-

Exerc.

2. De.

Gland.

Intest.

Ut ad

Podi-

cem

Succen-

turiatæ

Peyeri

sic ad

Glandis

Oscu-

lum

major-

rum

Glan-

dula-

rum aut

ductu-

um u-

nus aut

alter.

In se-

cunda

membranam duas in lamellas facilimè divides ; quarum prima tenuissima est, secunda verò consistentior. Huic affixæ sunt glandulæ : ita tamen ut supra posticam hujus tunicæ faciem versùs subiectam nerveæ tunicam ; aut supparem tunicæ , spongiosam substantiam extuberent , & tunicæ nervosæ velut appendæ spongiosâ excipiantur , eique innixæ reticulari contexturâ firmentur. Namque cum Corpus Urethræ spongiosum multiplici vasorum in omnem peripheriam flexuosè propagatorum congerie constans vasculosis ubique cancellis reticulatum sit & sinuatum ; inter reticuli plagas seu maculas Glandulæ nidulantur, scrobiculos foveolasque nactæ , velut ad formam & habitum suum exculptas ; nec-non vasculis plagæ lateralibus illarum parietes proserpentibus perbellè suspenduntur, pulchrèque irrigantur.

Et exci-
piuntur
spongi-
osâ sub-
stantiâ.

Velut
tunicâ
vascu-
lari.

Liquet igitur respectu Glandularum suarum spongiosam Urethræ substantiam tunicæ vasculari , quæ canalium & cavitatum glandulosarum tunicæ glandulosæ super-incumbit, comparari aptissimè posse.

At verò e multiplici vasorum strue velut e multis laminis vasculosis extructum Corpus Urethræ spongiosum ut
stru-

structurâ & mole reliquas in humano corpore tunicas vasculosas exsuperat, ita quod officii in illis exposuimus supra (a), aptius præstat.

Quem-admodum ad OEsophagum, ^{Poten-} Ventriculum & Intestina, tunicæ glan- ^{tiæ} dulosæ cavus eorum musculus circum- ^{Glan-} ducitur, aut in partibus reliquis glan- ^{dulas} dularum plano carneæ fibræ super-ex- ^{pre-} tenduntur, talis ad Urethram est exter- ^{munt.} na ejusdem tunica, interna crassior, & ^{Externa} villis orbicularibus texta, quorum con- ^{Ure-} tractione, constrictâ Urethrâ, contenta ac ^{thræ tu-} præter-labentia commodius expelli omnes ^{nica.} consentiunt Anatomici.

Neque excludenda omninò tenuis illa, ^{Panni-} solida tamen membrana, quæ cuti sub- ^{culus} jecta penem totum ambit arctissimè, ^{carno-} quam tum Antiqui, tum Neoterici, pau- ^{sus.} cis exceptis, Anatomici Panniculum Carnosum, (b) *Riolanus* Carnosi Panniculi productionem appellat. Idque ex eo potissimè velim, quòd ea ex parte, qua Urethræ super-extenditur, robustior atque fibrosa magis evadat in Viris præsertim mentulatoribus.

Equi-

(a) *Cap. I. p. 29., & 30.*

(b) *Enchirid. Anat. l. 2. c. XXXII.*

Velut
in Equo
Muscu-
lus.

Equinam Urethram semi-ambit Musculus ferè circularis satis validus, fibris constitutus ab ipso Penis corpore utrinque supra Urethram descendentes, & ad lineam Urethræ longitudini mediam sibi invicem adnexis & colligatis. Humanæ profectò Urethræ consimili musculo opus non fuit, analogâ tamen certè potentiâ, & necessitati suæ proportionatâ, licèt minori. Nec modò ratione contractilis potentiæ, sed etiam ratione arctioris involucris exaratus panniculus Urethræ constrictionem procurat: quo fit ut Nervosis Corporibus Urethra continuò applicetur, ipsisque cum spongiosa Urethræ substantia turgentibus, & extrorsum urgentibus, tuncque ipsorum distractioni contranitente Panniculo, Urethra magis angustetur.

Biblioth.
Anat.
Et Cor-
pora e-
tiam
nervo-
sa.

Corpora quin etiam nervosa peculiaris structuræ musculum constituentia ex *Malpighii* ad *Mangetum* Epistolis, musculi quòque officium supra Urethram præstant unâ cum Glande, ut Urethram & Glandulas comprimant, præcipuè quæ ad Urethræ fornicem sunt insculptæ, ipsique Corpori immediatè subjectæ. Hinc puto est quòd paulò magis consistentes tum Glandulæ tum exterior Urethræ tunica ad Urethræ dorsum videtur

detur qua longitudine Corpori Nervoso subjicitur.

Vascula igitur plurima a spongioso Urethræ corpore communicata glandulas perreptant irrigantque, atque a membranoso Folliculi cujusque pariete in cavitatula lenem humorem guttillulant, qui inibi velut in conceptaculo cogitur, ac detinetur, quò molles facileque distractiles Glandulæ momentulo turgescant in reticulorum macularumque gurgustiolis ab aliquanta distractione nequaquam coercitæ, vel impeditæ; identidem verò nitentibus passim in distractionem, aut turgentibus vasculis, glandulares folliculi arctiùs ambiuntur, passimque torcularis in morem coarctantur, utpote levi cuilibet compressioni facile cedentes, & obsequentes prementi.

Liquor
ris se-
cretio
in Glandu-
lis.

Reticulûs ergo vascularibûs Glandulas comprehendentibûs alterno systolis & diastolis motu agitantibûs, villis autem Urethræ applicitis assiduè in contractionem nitentibûs ac oscillantibûs, aliquid semper liquidi in Urethræ cavitatem emulgebitur, ut mulcentibûs rivulûs rara veluti psecade, ac mollî substillô Urethra passim ac ferè indefinenter suavi temperamentô leniùsque adluatur,

Excre-
tio fit a
vasis.

Facili- atur, leviculo ictui cedentibus canaliculo-
 tatur a rum saltem plerorumque brevitate, quoad
 tenuita- magnitudinem, ac consistentiam tenui-
 te Gland- tate, nec-non etiam positione illa, qua
 du'a- ita supra Urethræ longitudinem plerique
 rum & ita supra Urethræ longitudinem plerique
 Canali- jacent, ut eandem habeant cum Urethra
 culo- directionem: nempe quòd anteriùs, id-
 rum. est versùs Glandem prospectent, Ure-
 Eorum- thrâ in laxitatis, ac ordinario statu, de-
 que bre- thrâ in laxitatis, ac ordinario statu, de-
 vitate & orsum vergente ac inclinatâ, facilem ha-
 directi- beat liquor iste in, ac per Urethram de-
 one. fluxum.

Quod autem pauculi aliquot Urethræ alveo adversi notentur tubu-
 li, id universim non officit, cum maxi-
 mè difficultas ascensus a brevitate com-
 pensetur facillime superabili. Quin eti-
 am opposita Urethræ directioni paucu-
 lorum horumce tubulorum positio præ-
 cipuùm facere ad oppositum quandoque
 statum Urethræ, seuque liquoris ma-
 ximè indigum, conjectari possemus.

Remo- Ut verò ad majora, ut opus erat
 ratur ab identidem, dispendia tantulùm cumu-
 eorum laretur, frænari, ac morulîs cohiberi
 tenuita- liquoris hujusmodi fluxus debuit, id-
 te. coni- que præter canaliculorum tenuitatem,
 câ figu- que præter canaliculorum tenuitatem,
 râ, obli- conicam figuram, & obliquam positio-
 qua po- nem, aliqua eorundem tortuositas præ-
 sitione. stat, mollique proserpere flexu lym-
 phulam cogit. Inclinati quippe per lon-
 gi-

gitudinem Urethræ, interiorique ejusdem tunicæ exculpti canaliculi & Urethræ & nerveæ tunicæ varietatibus non obsequi nequeunt, sicque non directi semper, sed concidente laxâque in ordinario statu Urethrâ, laxi flexuosique sunt etiam in ordinario statu canaliculi, non incommoda sanè ad fluxum difficultate.

Ast ubi major hujusce liquidi influxus intrâ feminis, urinæque excretionem exigitur; quæ hujus liquoris copiam exigunt, ipsæ faciunt utræque per Urethram excretiones: namque decurrente supra compressiles facilè tubulos urinâ vel femine, Glandularum fluor facilè & copiosius exprimitur: Eoque maximè quòd tubuli dorsó suo supra Urethræ planum leviter prominuli, & obliquè producti id præstent ut comprimens desuper liquidum validiùs incurrat, & in transversè objectos Canales contra nitens vires concitet majores, eorumque majori momentò liquorem expressent

Concitato autem ad Venerem animali has quòque turgere Glandulas, & suum quoque stimulum addere minùs improbable videretur. Sic proludente etiam quandoque Venere succensis Genitalibus, distentâque Urethrâ & a turg-

Promo-
vetur in
Urinæ
feminis
que ex-
cretio-
ne.

Turget
in Ve-
nerem.

gentibus vasis in Glandulas & a turgidulis Glandulis in Urethram per tubulos facile patentes, tumque præsertim directos non sine impetu quodam tacitus ille & clandestinus in motibus illis primò propriis, ac ferè sine sensu, aut sanè consensu vel animadversione diffluet humor, in his præsertim qui Veneri magis facti, aptique ut reliquorum sic horum quoque genitalium siphunculorum magnitudine numeroque ditantur.

In eaque copiosius profilit. At verò in ipsa-met Venere quanto plus liquidi, majori cum impetu promptis quaquaversum emissionibus velut ejaculati profiliet, tanquam prolifico semini genuinoque accessori, quo præliniato tramite, adauctaque mole semini, ejusdem & facilior & voluptuosior viris ejaculatio, mulieri receptio contingat.

CAPUT III.

*De Glandulis Conglomeratis**Urethræ.*

UT proximo Capiti rem Disgregatarum, sic præsentis Conglomeratarum universim claritatis ergo præmittere & animus mihi & operæpretium erat; id tamen quum variis de causis mihi licuerit minus, sejuncti capituli locò habebis ea, in quæ passim exorbitavit calamus, generalem Conglomeratarum Doctrinam quoquomodo attingentia.

Ad globulum illud spongiosum, li-
vidum & cerasi-forme corpusculum,
spongiosæ, qua constat Urethra, sub-
stantiæ principium, non longa infra
Prostatas distantia, parvæ prostant Glandulæ,
minoris fabæ communiter magnitudine;
in hac enim variant admodum: inter
maiores quas videre contingit, illæ sunt
quas in Figura exhibemus. Pondus ad
lancem exigere (ut de Glandulis suis
Ant. Nuck) super-
vacaneum duximus.

Glandularum Urethræ
Conglomeratarum
Situs.
Magnitudo.
Vide Fig.
I. Litt.
MM.
Sialograph.
nova.

D

Ha

Facies
externa.

Harum facies est qualis vesiculis Seminalibus Simiarum à *Gerardo Blasio* (a) pingitur, seu melius species tota est glandularum conglomeratarum. Albidus gratusque qualis glandulis conglomeratis color; figura oblongo-rotunda, quæ tamen sub-indè variat; superficies inæqualis, velut ex acinis plurimis composita, seu hemisphæriis plurimis tuberosa.

Interna.

Interna Glandularum structura, quatenus attingi oculis potest, ex plurimis glandulosis pumicosisque acinis videtur constitui, quos non meras esse texturas vasculares *Nuckianas* (b), sed folliculorum peculiari corpore membranoso constantium congeries *Malpighianas* (c), est perquam probabile; utcumque indè peculiare hoc corpus glandulare canaliculo cylindrico vel advoluto in spiram, vel plicato in plicas ad modum intestinuli efformetur, quem-admodum structuras secretorias exponit Doctissimus *Bellini* (d)

Ab

(a) *Zootomiæ Tab. XII.*

(b) *Adenograph. curiosa.*

(c) *Ep. ad Soc. Angl. de struct. Gland.*

(d) *Opusc. Prop. XXIX. De mot. Bil. & Propos. XXXVIII. De Ferment. & Gland.*

Ab Utriculi cujuslibet membranosa substantia, peculiari quadam ratione, modificata in totidem lagunculas, seu cavitatulas extillat guttulis omni captu minoribus, & ex cellulis in canaliculos excretorios peculiare liquidum, diaphanum quidem ac limpidum, viscidum tamen ac tenax: licet non diffitear tantam in vivente animali visciditatem non adfore, cum mors humoribus lentorem inducat non suppeditatis, avolantibus, fixatisve particulis volatilibus, quod in saliva huic humori congenere *Sialo-graph. nova.*
Nuckius animadvertibat.

Harum itaque structura glandulis conglomeratis est omnino persimilis, Velut uno diversa discrimine soliditatis, quæ in Con-
in his Glandulis major est, quum reli- glome-
quæ conglomeratæ laxiores sint, & mol- ratis,
liores: Id tamen diversam non arguit structuram, & operandi rationem; hæc enim diversitas tota pendet a majori-Solidi-
bus vel minoribus spatiis glandulæ in-tatis,
terceptis, adeoque a majori vel minori loculorum, ac inter-capedinum copia ac amplitudine. Nimirum assiduus quidem sed modicus Liquidi hujus in Urethram proventus esse debuerat, ut ex infra-dicendis philosophari licet, hinc Ratio, minor loculorum copia ac amplitudo:

quare angustiores relinquuntur areæ, & glandula minus compressilis, minusque friabilis efficitur.

Et di-
versitas.

Simplicitatis amicissima simul & necessitatis provida Natura semper sapientissima, ratione requisitæ quantitatis liquidi debitam glandularum, seu glandularium folliculorum copiam accommodavit: vel in unum vel in plura loca confluendi causa vel in congerie congregavit, vel latius distribuit solitarias: excernendis diversæ consistentiæ lymphis, diversæ etiam consistentiæ glandulas tum Disgregatas, tum Conglomeratas adhibuit.

In di-
versis
glandu-
lis.

*Ep. ad
Soc. Reg.
Angl. De
Struct.
Gland.*

Humori Pericardii, Pleuræ, Tracheæ, Peritonæi, & Vaginalis Testium tunicæ tenuissimo liquori exstillando quòque tenuissimas ex observatione *Malpighii* Glandulas; Hominum & Quadrupedum OEsophago Medias, Volatilium OEsophago, reliquorumque animalium Ventriculi & Intestinorum & Narium muco, Auriumque cerumini crassiores, easque in eodem ordine diversimodè inæquales ad proportionem diversæ consistentiæ in liquido suo destinavit. Liquido Pancreatico utpote tenuiori glandulam minus compactam, seu potius friabilem; Salivæ Pancreaticæ
lym-

lymphâ aliquantillùm minùs difluxili,
 hinc Salivales magis compactas, visci-
 diori adhuc salivæ constantiores dicavit
 Glandulas, Tonsillas potissimùm, quæ
 & acinis constat, majoribus & naturali-
 ter admodum sunt pumicosæ, ut obser-
 vat Ant. Nuck, Articulorum axungia *Adeno-*
 glandulas, quas Tonsillis comparat ipsa- *graph.*
 rum detector Clopton Havers, quæ *curiosa.*
 ex membranis pluribus textæ densitatis *Osteolog.*
 habent & roboris plurimum, nec ita fa- *nova*
 cile admodum divelluntur. Sic etiam *Discursus*
 Prostatas ex valde tomentosiss efformavit *IV. De*
 utriculis, sic etiam par erat similem *Gland.*
 consistentiâ Prostatarum, liquorem ef- *mucilag.*
 fundentes Glandulas ex consistentibus
 magis acinis efformari, ut viscidiusculus
 liquor spongioso magis corpore melius
 excerneretur.

Quod maximè de Glandulis istis in In Vi-
 Vitulo, Porco, Ariete, Cervo, con- tulo,
 stat, quæ compactæ admodum sunt & Sue do-
 ferè carnosæ substantiæ; licèt id quò- mesti-
 que ex eo provenire censerem quòd, co, A-
 cum probabile sit hasce Glandulas Ve- riete,
 neris usu turgere, Vitulis in hanc pa- Cervo.
 lestram nondum admissis, immo a Ve-
 nere per castrationem emancipatis, pro-
 babile est, angustatis vasis, inanibus
 ferè oculis, retractis fibrarum fascicu-
 D 3 lis,

lis , minorem , gracilem , & duram reddi qualis observatur, Glandulæ mollem.

Glandularum canales excretorii in Homine.

Porro insensiles planè canaliculi singulorum acinorum excretorii in unum alveum concurrentes canalis excretorii principium intrà Glandulam constituunt, qui unus utrinq̃ue , alter ab altera egreditur Glandula , pellucidus & albumineo liquore turgidulus, statimque egressus versùs Urethram inclinatur, mox sub Ejusdem tunica longo aliquo tractu, trium scilicet transversorum digitorum longitudine defertur, donec paulò supra medium Urethræ , finem fortitur, ubi leviter compressus ab angusto ostio visceris liquoris globulos velut chrySTALLINOS depromit.

In Vitulo, & Suillo genere

In Brutis supra-citatis (quibus per- similis est Genitalium structura) ad terminum Urethræ carnosæ (sic appello canalem a cervice Vesicæ Urinariæ ad Penem productum , & musculofo corpore in hisce brutis obvolutum) insignis elevatur membranæ valvula ad instar velæ circum-tenfa , figurâ oblongo-triangulari, seu mitrali, Valvulis Venarum persimilis , vertice ad cervicem Vesicæ , basi ad elongatam inferiùs Urethram spectante.

Inter

Inter duplicatas hujus valvulæ tunicas canales prædicti deferuntur , qui tandem ad marginem Valvulæ in medio, duplici præ-angustoque ostiolo desinunt. Namque hîc loci est ubi abdominis cavum linquens fursum intorquetur Urethra , nervosis corporibus committenda ; ut proinde ne in ascensu suo renitens retro-laberetur lotium , apponi valvulam necesse fuerit , hunc regressum prohibituram : Atque ut hîc quodque loci restitantis fortè paululùm urinæ molestia caveretur , extillari a canaliculis liquidum demulcens necesse fuit atque præ-commodum. Aliquando sed rarò tamen ad-modum interior Urethræ tunica in viris ad præ-dictorum Canaliû orificia in velæ modum ac Valvulæ speciem elevatur , qua eadem ostia obvelantur. Id tamen per-rarum est adeò , ut pro genuino Naturæ machinamento haberi neutiquam debeat.

Eodem modo locantur ad Urethram *Equinam* Conglomeratæ , hîc quo. In E-
discrepantes uno , quòd istæ majorem habeant Conglomeratæ faciem , ut illæ magis quoad externum Conglobatis accedunt.

In *Fele Domestico* , seu *Cato* ad dome- In Fele
D 4 ra-stico.

radicem penis duæ adstant glandulæ Prostatæ æquales, exiguum una-quæque ductulum, in Urethram emittens. Carneæ sunt exterius, interius conglomeratarum granulata substantia: nempe nulli subjiciuntur musculo, vel ambiuntur; ideoque externa superficies fibrosa est: nisi fortè comprimuntur a musculis penis Erectoribus, qui prope glandulas hasce ab ossibus Pubis exoriuntur breves quidem sed validi, atque torosi.

In Mure domestico
maiore.

His consimiles sunt conglomeratæ ad radicem penis in *Mure domestico* *maiore* sive *Ratto* ponè musculos erectores sitæ.

In Echino seu
Erinaceo Terrestri.

Hujus esse generis autumo Glandulas illas *duas albas juxta testes, aliasve duas lutescentes iis minores*, quas in *Echino seu Erinaceo Terrestri*, a se dissecto observavit Franc. Willughby.

In Talpa.

In *Talpa* hasce dari Conglomeratas, aut sanè analogas ex *Schelhameri* observatione facilè judico, quam hisce verbis adducit Jo: Rayus: *Corpora extus carnosam manifestò, indeque rubicundissima; intus nervea, canali nerveo durissima prædita, qui longè ante vesiculas seminales in penem seorsim inferebantur; porro circa vesicam aliud occurrebat globosum*

Synops.
Hist.
Quadrup.

bosum, carneum parte exteriori, interiore nerveum in ipso Pene situm, in quod cum ex vesica aditus erat, tum & vasa semen deferentia terminabantur, ex quo Prostata esse apparebat. Sed post hanc demum insertionem ex dictis corporibus rotundis, canales illi nervei seorsim in penem abibant. Ita se habent hujus animalculi genitales partes, in quibus tantum apparatus haud inmerito admireris. Cum enim reliquis præter testes valde mediocres, quorum Parastatæ appendiculæ sunt, & glandulas Prostatas, vesiculasve, nihil Natura dederit; huic & maximos illos, & parastatas amplissimas, & reliqua; & insuper novum corpus seminale, ab his diversum ac separatum, novis ductibus instructum concessit, penem & facile omnium (ni fallor) animalium longissimum. Huc-usque citatus supra Jo: Ray.

Glandulis istis aut Prostatas analoga Analogum videtur glandula illa, quam accuratissimus Naturæ scriptor Franc. Redi, pro- quid
pe hepar in Cochleis nudis, seu Limaci- Limaci-
bus terrestribus (a), quas appellat Luma- bus ter-
D 5 coni- restri-
bus.

(a) Osserv. intorno agl' Anim. viv. che si trov. negl' anim. viv. p. 43. Tav. XII. Fig. 2. let. n. m. m. I.

coni ignudi, accuratiùs observat atque describit: *Ma siasi in che stato si vuole il testicolo, o che-che sia, sempre in quella parte co'la quale egli sta co'l vaso spermatico, à la sua estremità un altro canaletto sottilissimo pieno di materia bianca grossetta, il quale camminando per lo più a serpe a traverso del ventre senza avere attaccamento veruno nel mezzo, coll' altra estremità più sottile si attacca, e si ramifica nel fegato, o per dir meglio in un corpo glanduloso, di figura, e di composizione di parti simile al fegato, ma di colore un poco più rosso; il qual corpo è abbracciato, è circondato dal medesimo fegato, che è di lui cinque, o sei volte maggiore.*

Ita & in Lepore marino, quem ap-
Ibidem. *pellat Lumacone marino, de quo inquit:*
Le viscere interne, come gl' arnesi
In Lepore seu *tutti della generazione, il polmo-*
Limace *ne, il cuore, il canale degli alimenti son*
marino. *molto, e molto simili, e corrispondenti*
a quelle de' Lumaconi ignudi terrestri.

Pariformiter in Limacibus Cochlea-
tis, seu propriè dictis Cochleis: all' in-
In Cochleis. *torno del testicolo scappa fuori un sottil*
canaletto, che sciolto, e serpeggiante vada
ad impiantarsi in un certo corpo rosso
glanduloso situato, e nascosto nel mezzo
di

di quella massa che fanno gl' intestini ed il fegato aggrovigliati insieme. (a)

In Canibus conglomeratas hasce glandulas comperire non licuit; fortè quòd Prostatæ ad aliorum Animalium proportionem grandiores minorum istarum defectum satis supplere potuerint.

In Canino genere glandulæ.

Glandularum verò humanarum Canales excretorii principio suo sub Urethræ membrana altiùs demerguntur intra corpus spongiosum, cujus vasis in ingressu suo proximè ad initium ambiuntur, atque muniuntur; indè membranam Urethræ internam subeunt, ad cujus interiora paulatim emergunt, ut totâ ferè longitudine sua urethræ superficiem excurrentes, velut anaglypticè delineati, levique dorso prominuli apareant.

Canalium a Glandulis humanis Descriptio.

Quò Glandulæ propior Canalis est, & cavitas illi major, & tunicæ sunt constantiores, quò magis recedunt, cavitationis habent & roboris minus, sed utraque in progressu ad finem usque insensibiliter exilescent.

Deferuntur ductu non recto, sed aliquantulum obliquato: Namque cum primùm ad Urethræ superficiem emergunt emicantve, a se invicem recedere inci-

(a) *Id Ib. p. 50. Tav. XIII. Fig. 3. Let. F. e e e e.*

incipiunt, receduntque paulatim, mox cursu medio superato iterum mutuò inclinantur, ut illorum extrema ferè ad contactum aproximentur, exiguo non nisi relicto intervallo, sicque Canales singuli subcurvam lineam, simul autem elipsim prope, describunt.

Canalium etiam extrema non liberè in Urethram hiant, sed paululùm intorquentur & flexuosa fiunt in exitu suo, quod maximè apparet quoties ductus comprimitur, & liquor ad exitum urgetur. Hinc maxima setas suillas etiam minores insinuandi difficultas patienter superanda, quæ in reliquo, nisi fortè ad canalis in tunicam, Urethræ trajectu, nulla ampliùs occurrit.

An fortè *meatus ille novus sed exilis concavus*, quem in homine invenit Jo: Daniel Major cum Casp. Marchio (a), qui ex porositatibus Prostatarum in Urethram educitur & terminatur, per quem seminalis ille liquor in fistulam stillat referente Th. Bartholino, illorum sit unus Ductuum, quos invêni (ut candidè fatear) nihil certi possem statuere, cum Auctor a Bartholino citatus ad manus

(a) Anat. lib. I. De Inf. ventr. Cap. XIII. De Vâs. Defer. &c.

nus meas nundum pervenerit, licèt Ejusdem Consultationes Medicas aliquot viderim relatas ab altissimi nominis Viro Medicæ toto orbe Universitatis Bibliothecario, de rebus Anatomicis, Chymicis, Pharmaceuticis, Medicis optimè merito, Jac. *Manget* in suo, verè *The-
sauro Medico-Practico*. Quatenus tamen ex *Bartholini* relatione constat, non puto Adversario fortè alicui ansam dari posse ut Glandularum, Ductuumque Nostrorum novitatem audeat impugnare.

Propius est ut Ductus Nostros comparem Canalibus liquorem pituitososerofum ad Urethræ confinia in Uteri Vaginam deponentibus, quos in Muliere detexit *Graaffius*, (a) in Vaccis *Malpighius*, (b) & tum in Vaccis tum in Mulieribus elucidavit Casp. *Bartholinus* (c) a *Clarissimo Du Verney* Regio *Parisiensium Anatomico* primùm (ut ipse fatetur) edoctus. A Glandula nimirum ex plurimis aliis (ut *Bartholinus*) seu a folliculis subrotundis glandulosis (ut *Malpighius* vult) conglomeratâ in Vaccis, in Mulieribus verò
a Cor-

Similitudo cum canalibus uteri vaccinis.

(a) *De Mulier. org. Gen. inseru.*

(b) *Dissert. de Utero.*

(c) *De Ovar. Mulier. Epist. ad Gul. Rivam.*

a Corpore Glandoso Prostatibus virilibus
 per simili, Canales duo, in Vassis satis
 spectabiles, in Mulieribus proportionem
 longè minores, hi stylum, hi fetam
 duntaxat suillam, admittentes ad Vagi-
 næ latera emittunt, qui latò capitulò
 evidentique hiato (ut cum *Malpighio*)
 seu conspicuo & in Papillam protube-
 rante ostio (ut cum *Bartholino* loquar)
 in Vassis, nulla in Mulieribus protube-
 rante Papilla, supra meatus urinarii ori-
 ficiū, subviscidum liquorem emit-
 tunt, quo & lubricatur, & in venereo
 clysmatico opere delectabiliter inspergi-
 tur plena voluptatis fœminarum vagina.
 Immo quavis comparatione aptior & ac-
 commodatior illa est Glandularum no-
 strarum similitudo cum Glandulis hisce
 duabus, quas ad Leporis fœminæ vagi-
 nam, Testiformes appellat Jo. Jac. *Har-*
derus, atque describit *ex albo-flave-*
scentes, magis quoad externam faciem
quàm internam Conglobatis similes, dis-
sectas & pressas humorem e suis porulis
hìc illic reddentes albidum crassiuscu-
lum, qualis in non-nullis animantium
Prostatibus deprehenditur, corpore tor-
tuosò sub-fusco velut epididymis utrim-
que ambitas, unde ductus tortuosus ceu
eja-

Schol.

Observ.

ix. Fig.

I. Lit. b.

*ejaculatorius prope orificium externum
interius inseritur.*

Traductam a *Malpighio & Bartholi-
no* canalium horumce descriptionem,
fortè nimis obscuram ne culpes (Amice
Lector) utpote ex Clarissimis Viris ex-
cerptam, contractamque eo solùm con-
silio, ut institutam Glandularum du-
ctuumque novorum cum illis analogiam
juxta-positione evidentiùs demonstra-
rem, utque etiam confirmem Glandu-
las, quas superius exposuimus Urethræ
Disgregatas cum Glandulis & canaliculis,
quibus Vagina, totusque Uterus irriga-
tur, analogas esse.

Quibûs jam constantibûs probatâque Cum
aliunde a præcitatis Authoribus harum Prostata-
Vaginæ Glandularum cum glandoso ma- tis viri-
riûm corpore seu Prostatis comparatio- libus.
ne: facilis Tibi largirer (Lector Pru-
dentissime) ut si fortè Glandulis nostris
(ut novis rebus solemne est) novum
procudere nomen ad clariorem intelli-
gentiam utile censeas, illud ab instituta
analogia eruas, & *Astites conglomerata*, Et indè
seu Prostatas minores denomines, Cogno-
minatio.
quibus liquor tum muliebris tum virilis
Glandosi corporis liquori analogus ex-
cernatur, velut qui insensibiliter perco-
lando Urethram irroret ne exsicceetur, Usus.
sub-

Qualis
Disgre-
gata-
rum o-
mninò.

subliniatque ut ab urinæ feminisque acrimoniâ muniatur : impetuosè autem projectus Urethram suavissimè afficiat in coitu. Ut ideò superiùs exposito Urethræ Disgregatarum usui, similis non modò, sed idem omninò Conglomeratarum apareat.

Ratio.

Nè verò per Urethræ longitudinem istæ fuerint (illarum more) dispersæ, per tractum videlicet a Prostatis ad usque ubi nunc aperiuntur earum canalîa, seu (quod idem) ubi pullulare incipiunt Disgregatæ; prohibuit fortasse necessitas compressionis, cujus ut indigæ erant, ita obtinendæ minùs aptæ, hujusmodi in tractu, ubi fistula urinaria superiùs corporibus nervosis partim sejuncta, partim laxiùs unita, inferiùs spongioso corpore multo, velut tomento obfarcta, compressionibus aut destituitur, aut cedere satis ad glandularum expressionem non potest. Colligi itaque ac velut confluere illuc omnes debuere, ubi potentiam muscularem oportunè advolutam sibi possent nancisci. Sicque major colligi humoris copia, unoque jactu emit- ti potest quàm major fortè est ejusdem, & quidem copiosioris necessitas, uti superiùs conjectabamur in Brutis; in illo videlicet freto, in quod ab Acceleratori-
bus

Vid.
pag. 54.

bus suis angustatur Urethra , ut illac ar-
ctius fluente semineo , urinosoque liqui-
do , facilius posset exuri.

Quoniam verò liquor iste fluxilior te-
nuiorque esse debuit ut longiusculo
exiguoque canali tranando par esset ;
minus congruum Naturæ fuisset glan-
dulosa mole Prostatas augere , ab iis-
que liquorem istum petere , a quarum
propria textura non nisi viscidiusculus
humor secerni consuevit ; nisi fortè id in
canibus præstitum , quibus prostatarum
liquor , analogo Conglomeratarum ad-
stitum liquori fortè permixtus , videtur
longè serosior.

Cum hisce usibus liquidum istud in-
serviat , ut vel sola rei expositione , ac
contemplatione ex insinuatis Capite præ-
cedenti liquet , facile intelliges rerum
Mechanicarum & Anatomicarum peri-
tus , in hoc opere tale esse Naturæ ar-
tificium debere , ut passim , lentè ac
sensim flueret hoc liquidum in ordina-
rio statu , & data occasione impetuosius
prosiliret ; ut de Disgregatis disseruimus
supra.

Ut ergo passim in Urethram flueret ^{Nulla}
hoc liquidum , nullam emissario Canalis ^{ad cana-}
muliebris aut virilis apposuit caruncu- ^{lis exi-}
lam aut papillare impedimentum , ne ^{tum ca-}
E ^{la.} cum

cum assiduus , aut ferè assiduus saltem esse debeat liquoris proventus , in assidua , vel ferè assidua actione Potentias detinere cogeretur : quod cum nimis implicitum evaderet , non oblitæ machinarum suarum , sed bene-sapientis Naturæ fuit Carunculam , aut Papillam deficere : opposita autem ratio voluit Carunculæ Deferentium orificia , Papillis Prostatarum canaliculos muniri. Quamquam & illud Astitum conglomeratarum canales ab hoc objice potuit liberare , Urethræ necessaria nimirum æqualitas papillæ elevatione facilè lædenda.

Sede ejus
loco
aliæ re-
sistentia
Harum resistentiarum loco remoras
plures habet hoc liquidum in se ipso , in Glandula , in canali suo : in se ipso propriam visciditatem ; in canali extenuationem parietis , & cavitatis suæ , canalis ascensum , obliquitatem , extremique intortionem ; in Glandula minorem cedentiam & compressibilitatem , qua fit ut difficilius urgeri introrsum tota glandula singulique acini possint , unde alioquin promoveri secretiones & secreti liquidi fluxus non est ut hîc loci probemus.

Ut col-
ligatur
tantis-
per li-
qui-
dum.

Hæc inquam omnia facilè puto ut in ordinario statu sensim & lentè fluat hoc liquidum. Eidem usui Canalis Vaccini

cini emissario apposita est Papilla, velut canalibus Deferentibus Caruncula, & canaliculis Prostatarum in Urethram hiantibus Papillæ, ne vel noxiè vel inutiliter prodigeretur liquor, sed opportunis temporibus cumularetur, quibus abundanti profusione usum cui destinatur melius præstaret. Huic usui cui Papilla in vaccinis Canalibus, sufficit liquoris visciditas, & exilitas exitus in Canalibus muliebribus, recensitæque resistentiæ in Virilibus. Quæ propter copiam liquoris nitentis in emissarium in Vaccis fortè minùs sufficiebant, sed aliud impedimentum, Carunculæ scilicet, fuit molliendum.

Hæ resistentiæ utcumque leves ali-^{Poten-}quo saltem momento sunt superandæ ^{tia sunt} potentiis ad Glandulas & Vasa opportunè adhibitis; his inquam potentiis, eoque artificio applicitis, ut ordinariò velut otientur, & levem saltem actionem exerentes, hujus liquidi secretionem, excretionemque lentè procurent. Datâ verò necessitate agant validiùs, quin etiam aliquando validissimè.

Mites ita-dixerim potentiæ sunt Arteriæ & Vasa Glandulæ distributa, eisdemque & Canali adjacentia. Nimirum a vasis proximis furculi in plures discer-

pti ac ferè reticulati singulos exterius acinulos irrigant, ac intercepta acinulis spatia subeundo Glandulæ meditullio altius infiguntur.

Arteriæ. Adjacet verò Glandulæ Arteria, corpus Urethræ spongiosum irrigans, quæ postquam Glandulæ ramos distribuit, ejusdem regionem præter-gressa, duplici ramo in corpus spongiosum inferitur. Ductibus excretoriis accumbunt Vasa ipsa Urethræ corpus spongiosum contextentia, quæ ideò providè canalis exortum statim arctius complectuntur, reliquum comitantur adjacentes.

Cum
Venis
supra
Glandulas
reticulatæ.

Vasa itaque liquidum Glandulæ inferentia non ad nutritionem ac vitalitatem modò, aut ad secretionem quomodo-libet illud suppeditant, sed ad liquorem secretioni disponendum, discernendum, secretumque jam promovendum in fluxum ad proportionem parvitatis in Glandula & liquore suo aptissimè comparantur. Nimirum Glandulam involvens exiguus ille vasculorum reticulus quantum (ad proportionem exiguæ etiam Glandulæ) mutuis fluentis intra ipsum sanguinis incursibus & allisionibus, & per consequens divulsionibus a cohæsione sua, ad secesum partis a parte, seu ad secretionem

dis-

disponat, patet ex iis, quæ de reticulorum vascularium usu in animalibus solidè non minùs quàm facundè disseruit Vir prodigiorum in Mechanico-Medicis *Laurentius Bellinus.*

Contractio insuper & distractio Arteriarum præcipuè, tum quæ Glandulam ^{Glandulis ad} fubeunt, tum quæ ad Glandulæ ^{con-} ^{jacentes} ^{per eas-} ^{que dis-} ^{tributæ.} tactum excurrunt, nisu distractionis suæ vel Glandulam totam ad contactum positam, vel unam-quamque Glandulæ partem, inter duas quasque Arteriolas comprehensam, alternè comprimant, alternè liberam a compressione relinquunt, ac alternè liquido suo impleri Glandulæ utriculos, alternè secretum in finulis liquidum agant in canales suos, & extra canalem derivent.

Insuper adhærentia per Canalis longitudinem, aut transversè, ad initium præcipuè, vasa spongiosum Urethræ ^{Ure-} ^{trhæ} ^{Vasa,} corpus contextentia, cum distractilia sint & contractilia, erunt & ipsa potentiolæ quibus liquidi fluxus & exitus promoveatur. Potissimùm contra impedimentum visciditatis, necessarium fuit potentiolas seu motus distribuere seu digerere ad superficiem externam canalium, quibus canalis sectim premeretur, ac urgeretur introrsum, ut tum a mutuo

contactu , tum a contactu parietum divelleretur liquidum , & singulæ moles liquidi agantur vel ad immissarium , vel ad emissarium , ut indè a liquido superaffluente ex immissario versùs emissarium , immo & extra determinetur , quâ pater exitus.

In minutio
resisten-
ciarum.

Rursum ut in hoc canali fluxui remoram facit cavitatis extenuatio , sic facilitatem aliquam præstat membranarum gracilescencia.

Rursum ut conica vasculi figura impedimentum efficit ad fluxum , ita facilitatem præstat inæqualitas momentorum quibus canalis præditus est : neque enim momentum suum denegandum est membranulis canaliculum constituentibus , cum instructæ sint facultate contractili. Cum enim crassiores sint tunicæ ad immissarium , seu propè glandulam , tenuiores ad extremum , seu emissarium , fiet , ut ad immissarium canalis major sit facultas contrahens , minor versùs emissarium : Quare contentum liquidum sensim urgebitur ab immissario versùs emissarium , nempe a loco ubi crassities villorum major est , atque ideò major validitas facultatum contrahentium , & momentum earumdem majus , ad locum ubi villorum crassities

fities minor, ideòque momenta contractionis minora.

Quo-ad canalis intortionem probabile est eo tempore, quo major exigitur liquidi copia, ex obliquo directum fieri, distenta nimirum Urethrâ.

Momentosa autem magis potentia musculus est, qui valido involucro glandulas utrasque ambit, atque complectitur, quem subsequente mox Capite exponam: postquam candidè professus fuero quod hoc ipso momento contigit, sinè publica professione neutiquam prætermittendum:

nec si miserum fortuna Sinonem. Finxit, vanum etiam, mendacemque improba finget. Virgil. Mar. Æneid. l. II.

Huc usque jam planè deveneram; cum amicissimus unà ac Clarissimus D. Joseph. Paschalis me perhumaniter moniturus, retulit Mons. Mery (Accuratissimus ille, & exactissimus Parisiensium Anatomicus, nunc Regii Nosocomii (l'Hotel Dieu) Chirurgus primarius) a aussi decouvert dans l'homme sous la partie virile deux petites glandes de la grosseur d'un pois. Elles sont placées a des sous des muscles accelerateurs, & éloignées du corps des Prostrates d'environ un pouce. Officium benevolentis Viri monitum non

maximè gratum habere non potui utpote quo aut negligentis aut plagiarii notam, quæ mihi (ut candido cuique) semper teterrima visa est, longiùs declinarem; quoque palam professò eum me hominem præstarem, qui agere omninò velit ingenuè.

Pro hoc utique candore, pari mihi libertate liceat apertè dicere, me glandulas istas ex me non invenisse modò, sed & qualis sint naturæ (conglomeratarum videlicet) quo canali, quòque liquore præditæ, quos usus, quibusque mediis præstent, quibus, qualesque in brutis adsint, quibus, qualiterve denegatæ suppleantur analogis instrumentis, exposuisse; ut quibus præcipuè morbis obnoxia sint mox enarrabo: quibus sanè desideratis, næ ego glandulas illas a me inventas, aut satis perspectas habuissem.

CAPUT IV.

De Glandularum Urethrae Conglomeratarum musculo.

AST ubi difficilioris momenti occurrit resistentia, validioris quoque momenti potentiam applicari animalium mechanices, seu mechanicæ peritiae plenum artificium naturæ voluit. Hæ potentia illæ sunt quæ majori vigeant momento contractionis, nec sola instructæ sint facultate contractionis naturalis, sed etiam contractionis superadditæ; nempe instructæ sint villo contractili, seu fibra motrice carnea, quibus facultates contractiles constituuntur. Id sapientissimè factum jucundissimè observamus in canalibus conicis, in quibus liquidum de se ipso iners fluere debeat a latiori inmissario in canalem vel emissarium angustius; ad superandam occursum resistentiam ad singula canalis segmenta, vel ad inmissarium, potentia muscularis ad conibasim apponitur, velut ad basim seu inmissarium coni, seu conici canalis arte-

Muscularis
Emboli
necessitas ad
fluidorum
motus.

Tract. de Fibr. mot. & morb. specim. l. 1. riosi musculus cordis constituitur, cuius vim, agendi modum, & æquilibrium; in sê, ad canales, & liquidum suum doctissimè Præclarissimus *Baglivius* exposuit.

Et quum hæ resistantiæ potissimùm occurrant ad secretionem, & excretionem liquidi per glandulas, & canales suos, industrie Naturæ artificium potentias musculares ubique adhibuit, quibus a glanduloso corpore exprimeretur in inmissaria seu canaliculos excretorios, ex his urgeretur in canalem communem, tandemque in emissarium, sicque superaretur quidquid resistantiarum adest in glandula, in canali, in contento liquido. *Exemplum luculentissimum & veluti maximam glandulam patentem oculis habes in Intestinis ex Bellino:* Machinam comprimentem in abdominis musculis, qui momenta sua cum dirigant ad singula puncta contentæ cavitatis, aguntur quòque vi contractionis suæ, videntque super intestina tanquam super magnam glandulam, & in Lactea agunt, & per ipsa tanquam per canales excretorios urgent; Ut magna hæc secretio in magna hac glandula musculosis planis plurimis efficitur, sic reliquæ in animalium corpore secretion-
nes

Opusc. de mot. cord. de ferm. & gland.

nes in glandulis musculosa fibra perficiuntur.

In iis verò præcipuè secretionibus, Liqui-
quibus fluidum iners separatur, quas-dorum
que repentinis quibusdam motibus ali-præfer-
quando fieri uberiores oportuit, mus-tim pi-
cularem potentiam præfecit. Cum enim-grio-
rum.

tale fluidum non sit sufficienti instru-
ctum impetu ut possit sê- ipso fluere,
debet eundem aquirere a compressione
extrinseci, ideoque ab aliquo contra-
ctili, & cum major datis temporibus
emunctio liquidi necessaria sit, ideò
major contractio comprimentis involu-
cri, quare involucrum illud non so-
lùm naturali, sed etiam super-addita
contractione contractile sit oportet. Fa-
sciculus autem naturali, & super-addi-
ta contractione contractilis quid aliud
esse nisi musculus potest? Hinc cum
salivæ uberior proventus inter mastican-
dum sit necessarius, ejusdem glandulis
& ductibus admovit potentias, quæ in-
ter masticandum agitantur quas exponit

Casp. Bartholinus.

At quid ego de musculis super inte-
stina, & supra glandulas reliquas vigen-
tibus? Quid ego de glandulis salivali-
bus? ut ostendam necessitatem musculi
glandulis nostris super-imponendi. Ex-
empli

Existen-
tia ad
glandu-
las Vac-
carum
vagina-
les.

empli certissimi, & plenæ analogiæ loco ponam quod de glandulis suis vaginalibus habet Casp. *Bartholinus*; Nimirum Præclarissimus Auctor (a) *hasce glandulas (Vaccarum vaginales) fibris carneis peculiaribus & propriis undique investiri observavit: quia humor externi non potest nisi protuberante papilla, prospexit Natura glandulæ fibris carneis, quibus in actu venereo, cum liquor excernendus est, premerentur glandulæ, ut papillæ protuberarent. A Sphinctere vesicæ videntur hæ fibræ carneæ oriri, quem-ad-modum & Virorum Prostratas a musculosis fibris super-impositis a Sphinctere vesicæ oriundis contrahi asserit Regn. De Graef. Quin & glandulas illas, quas in Talpa Prostratas conglomeratas, aut iis saltem analogas ex Rayo retulimus supra (b), muscolari involucro minimè destitutas observo ex hisce met Auctoris prælaudati verbis (c): Cumprimis verò considerari dignum omnes has partes carnosas tegumentis muniri, ex quo manifestum fit contrahi eas, atque*

(a) *Epist. ad Gul. Rivam De ovar. mulier.*

(b) *Cap. 3. p. 73.*

(c) *Synops. Hist. Quadrup. Tit. Talpa,*

atque sic seminalem materiam propellere &c.

Præter necessitates itaque quas communes cum glandulis omnibus conglomeratis & præcipuè cum salivalibus habent nostræ conglomeratæ, cum uteri conglomeratis glandulis *Malpighianis* aut *Bartholinianis* peculiarem habent necessitatem mechanicam ut eodem, quo illæ, modò, iisdemque rationibus carneos sibi lacertulos, fibrasve musculares adsciscant, qui naturali contractione, & compressione sua-liquidum a glandula sensim exprimant, & per canalem sensim urgeant: contractione verò super-addita liquidum glandulæ & canalis velut embolus in fyinga impetuosè projiciant.

Muscularis iste fasciculus portio est musculi urethram constringentis, quem ^{Musculus ad} non-nulli apud *Galenum* (a) appellant ^{Astites} *Sphincterem*, seu *strictorem*; uti post ^{conglomeratas.} *Galenum Vesalius* (b), *Valverda* (c), & Vesaliani cæteri, qui pro genuino vesicæ Sphinctere attulerunt: *Riolanus*

(a) *Anat. Administ. lib. vi. cap. xiv.*

(b) *Anat. de Corp. Hum. Fabr. lib. ii. Cap. L.*

(c) *Lib. xi. De Musc. Cap. xxxiv.*

nus (d) Sphincterem vesicæ externum,
Lindanus Spleniatum, seu Fascialem
 apellat.

(d) *Enchyrid. lib. v. cap. xiv. de musc. ves.*

CAPUT V.

*De Morbis Glandularum Urethræ,
 & speciatim Gonorrhœa.*

Occlu-
 sio à na-
 talibus
 & aliò
 apertio. **U**T pars organica quælibet, mille-
 nis obnoxia læsionibus est, ac cru-
 ciatibus exercetur Urethra virilis, suo,
 vel partibus aliis, præsertim vicinis
 communi vitio. Præter-naturali genesi
 meatus ad Glandem imperforatus con-
 tingit (a), ut præter Veterum monu-
 menta observat Goth. Sam. *Polisius* (b);
 loco infueto aperitur, ut apud Th. *Bar-
 tholinum* (c), Convulsione tenditur, vel re-
 tra-

(a) *Joh. à Meckren obs. med.-chir. ; Melch. Fribe obs. 98. misc. med-phys. A. 3 Beniven. c. 9. ; Bierling. obs. 204. ; Ephem. med. phys. Germ. ; Gerh. Blasius obs. med. 5.*

(b) *Obs. 106. Misc. Med-phys. Dec. 2. A. 9.*

(c) *Anat. Ref. l. 1. c. 24. ; Blancard. inst. chir. par. 2. cap. 14.*

trahitur (d), etiam subitanè (e), Pa- Con-
 ralyfi enervatur, Phlogofi exurit^{vulso,}; ^{Paraly-}
 Pruritu vexatur, Tumore tunicarum, ^{sis, In-}
 quandoque crudo, quandoque puru- ^{flam-}
 lento (f), aliquando etiam carcinom^{matio.}
 toso, vel Sphacelo afficitur; Acri suo- Tumo-
 met liquore, urinâ, purê, vel calcul^{res varii}
 excoriatur pertranseunte; eodemque in- ^{Sphace-}
 hærente (g), vel innato (h) vel sabu- ^{lus Ex-}
 lô (i), tumefactione, tumore, hyper- ^{coriatio}
 sarcosi, vasorum interiorum varice ut ^{unde}
 mihi observare contigit ad radicem ure- ^{tuber-}
 thræ, & Petr. Bayro (k), & circa ru- ^{cula}
 gas Vaginæ uteri Steph *Blancardo* (l): ^{Obstru-}
 Sanguinis grumo (m), purê crasso, ^{ctio.}
 vermibus (n), extraneisque (o) diver-
 si

(d) *Job. Schmid.*

(e) *Petr. Sorbait.*

(f) *Hippochr. Aph.*

(g) *Nic. Tulpius obs. l. 4. cap. 34. Jo. Bur-*
gius, Theoph. Bonetus.

(h) *Laur. Ferhr, Helvig. & Schroeckius*
Dan. Winclerus.

(i) *Jo. Schmid, Dodonæus, Schenckius.*

(k) *Pr. l. 5. c. 3., Severinus, med. Eff.*
pag. 80.

(l) *Inst. Chir. part. 3. c. 20. de Hæmorrhoid.*

(m) *Amat. Lusitanus c. 6. cur. 19., Wincl.,*
Jo. Schmid., Mel. Frib.

(n) *Dodon. Ann. ad c. 77., Ant. Beniv. obs.*
mir,

Com-
pressio. si (p), & absconditi etiam generis (q) (de
quibus fuse Ephemerides, & Compila-
tores) obstruitur. Externis, puta tumo-
ribus, hæmorrhoidibus, aut duris faci-
bus, penis distensione, phymosi, hydro-
pæ, inflatione (r) premitur, angustatur-
que: Vulnere (s), aut contusione (t),
læditur. Ab externâ intemperie commu-
nia cum Pene patitur. Ab initio admis-
sis irritatur, inflammatur, eroditur. Vas-
culorum ruptione, vel erosione, Hæ-
morrhagiâ, sanguineo mictu (u), ac
tincto semine, partium seminalium vi-
tio

Vulnus.
Contu-
sio.
Intem-
peries.
Mictus
sanguis-
neus.
Gonorr-
rhœa.
Ulcus.

mir., Fernel. *Path. l. 6. c. 10. Schol. Holl. ad c. 50. l. 1. de morb. int.* Cardan. *com. in Aph 76. Sect. 4. Hipp Rondolet. hist. aq.*, Ronfæus *epist. med. 10.*

(o) Molinett. *diff. Parth. l. 6. c. 8.*

(p) *Plumbo Ol.* Borrich., *pilis plumbeis Sigis.* Elsholt., *globo sclopet Act. phil. Angl. m. oct. 1668.*

(q) *Polyp. viv.* Schultz., *Animal. millep. simil.* Duret., *Asell. viv.* Jacob., *Inset. viv. nigr. form. scorpionis Th.* Barthol. *hist. anat. cent. 4. Sc.*, *Flatu Wolfg. Wedel. in epist. Th.* Barthol. *Ol Borrich. officulo Th.* Barthol., *pilulâ purgante Id;* *Pilis Dan.* Horst. *epist. ad To. Barthol. Andr. Cnæff.*, *David. Spielemberg.*

(r) Dodon., Schenckius.

(s) *Regn. de Graaff. de virg. org. Jo. Haybrechtz.*

(t) *Apud Galenum.*

(u) *Luc. Hannæus.*

tiō Gonorrhœis inficitur : His aliisque
causis ulcerē, fistulâque perfoditur ; un-
de urina loco non convenienti emitti-
tur (x) ; aut post ulcus coalescentia mea-
tus contingit (y).

Fistula
Coales-
centia.

Meæ autem operæ pretium est illos
duntaxat morbos exponendos assumere,
qui à Glandularum exaratarum vitio
pendere propius videbuntur. Et qui-
dem, cum partium omnium morbi à
solidi, ac liquidi ejusdem partis læsione
dependeant (quod nuper illustravit Illu-
strissimus ipse Summi Antistitis Medi-
cus, & Medicorum primus Antistes Jo.
Lancisius (z) ita istarum morbi ab ho-
rum vitiis omnino petendi.

Propriis
Glan-
dula-
rum U-
rethræ.

Ratione igitur solidi, causa morbo-
rum in hisce glandulis erit quidquid
glandularum quantitatem continuam vel
discretam, vel internam structuram,
aut libertatem canalium, aut motum
potentiarum ad glandulas lædere potest.
Ratione fluidi quidquid liquidum ha-
rum

In Soli-
dis

F

rum

(x) *T. b. Bartholinus hist. c. 4. p. 422.*, *Sal-
muth. cent. 1. obs. med. obs. 60. nu. 39. Eustach.
Rudius l. 2. c. 53.*, *Am. Lusit. cent. 2. sur. 21.*,
Platerus obs. c. 792.

(y) *Jo. Wierus.*

(z) *De morte subit. lib. 3.*

rum glandularum minuere , augere , incrassare , solvere , acuere , aut consimiliter modificare aptum est.

Natales Eaque vel à primordiis , vel adventitia. Nimirum velut è partibus geminatis alterutra , sic è multiplicatis aliquæ [naturâ subindè in organis præsertim genitalibus ludente] deficiunt , exceduntve. Primum in Conglomeratis (a) , secundum in Disgregatis contingit. Major minorve moles evenit , aut proportionata reliquis partibus , aut improporcionata : ità densitas , aut laxitas ; ità canalium conformatio ; sic & potentiarum appositio varia , non finè aliquo , levi saltem , officii detrimento. Aberrare etiam posse quis dubitet Adstitum canales ? quem-ad-modum ductus salivalis apud *Kerkringium* Spicileg. Anat. observ. 68.

Adventitii. Adventitiæ solidorum læsionis aliæ ab externis sunt , aliæ ab internis. Primæ in re præsentis sunt vulnera , contusiones , stimuli. Secundæ sunt Glandula-

(a) Fortè in Andria Martel apud Georg. Abrah. Merchlinum , & in aliquibus ex Hermaphroditis ; fortè etiam in illo , cui à nativitate , Penis proaro fuit nullâ cum vesica urinaria Wolf. Striegel. in litt. Viennâ datis ad Sachsum.

larum congestiones, vel exesiones, canalium corrugatio, compressio, obstructio, potentiarum adjacentium paralyfis; vel convulsio, quatenus ab aliorum solidorum vitio, aut à liquidis pendet laxitatem nimiam, aut rigiditatem, aut consimilem intimioris structuræ labem glandulis, aut partibus adjacentibus lentius citiusve inducentibus.

Vulnere pariter ac contusione contingit, ita ac structura, vulnere autem quandoque magnitudo etiam, & numerus læditur. Porro ex vulnere harum glandularum præsertim Adstitum, atque earumdem canalium non nulla evenisse incommoda possunt; tum illa maxime quæ vulneratis Glandulis (b); earumque Lymphaticis (c) atque in Salivalibus præsertim superioribus, & lachrymalibus contingunt; quod ultimum evenit magno *Hildano* (d) curanti, sed ista nescienti, quodque clarè exponit *Joh. Munnicks* (e). Nempe ut glandularis lymphæ passim extillet, præsertim.

F 2

in

(b) De conglobatâ inguinali *Frider. Ruysch. obs. anat. Chir., Fabr. ab Aquapend. l. 1. de tumor. cap. 13.*

(c) *Jo. Muys. in Prax. chir. ration.*

(d) *Cent. 5. obs. 80.*

(e) *Chir. ad prax. Bod. adorn. cap. de vuln. fac.*

in ejusdem partis motionibus , fonticulo difficilè exsiccabili , & aliquando in fistulam abeunte ; ut ex fauciato salivarium altero in Milite Regiminis *delle Guardie* unà cum Domino *Panealio* observabam. Hæc tamen non adeò timenda in Adstitum earumque canalium vulnere, quàm sit in salivarium , propter glandulæ canalisque exilitatem , & liquoris cum paucitate visciditatem , licèt inflammata tùm parte affluxus major fiat. Aut post vulnus coalescit, occluditurque meatus, canalis reliquo ad usque glandulam facilè in folliculum , seu sacculum dilatato. Chirurgis præsertim Lithotomis in sectione pro calculo vesicæ, & magis urethræ in hoc situ has glandulas, hos canales propono.

Contu-
sio. Contusione fibræ, ac nervi tum glandularum, tum partium appositarum distrahuntur, distorquentur, laxantur, franguntur; vasa comprimuntur, dilatantur, & contorquentur, aperiuntur, lacerantur; unde liquores universales, & particulares glandularum impediuntur, effunduntur, stagnant; unde tumores, inflammationes, sphacelli, ulcera, glandulis, partibusque vicinis non difficilè super-venient.

Perfricatione fibræ tum nerveæ, tum mus-

musculares motitantur, & ad frequen- Exerci-
 tes contractiones, oscillationesque adi- tationes
 guntur; adeòque tubulis ad glandulas violenta
 deferentibus, aut eferentibus irregula- tæ ad
 riter percussis, liquores mox vividè pel- partem.
 luntur, mox otiosè relinquuntur, mox
 strictè impediuntur in fluxu suo, sem-
 per tubuli, ac præsertim sinuli fibrarum,
 & glandularum distenduntur, cùm re-
 petitis potissimùm percussionibus liquo-
 res majorem in parte motum concipiant,
 atque rarefiant. Hinc multiplicato, ac
 adaucto confertim motu ad partem, im-
 peditoque passim regressu pars velut in-
 flammatur, exprimitur affatim liquor
 Glandularis, etiam quandoque sangui-
 neus. Sed & crebrioribus distensionibus
 vasculorum ac sinulorum, tum fi-
 bræ tum glandulæ cavitas laxatur, dis-
 torquetur, inmutatur; Unde laxitas,
 attritio, aut consimilis perversio in va-
 sis, textuve fibroso Glandularum, aut
 potentiæ adjacentium, quâ stagna-
 tiones ac impedimenta fluxûs humorum
 in glandula, & canali fient (a); aut in
 cribris glandularum aut in canalibus,
 quâ nimia fiet harum Glandularum ex-
 pressio; adeòque & majori pressione,

F 3

&

(a) Veluti fit nodus virgæ Job. Ionsom Syn-
 tagm. Med.

& majori copia liquidi extendentur tum secretoria tum excretoria Glandularum. Quam-ob rem ab hoc fonte nimix oscillationis æquè nimios effluxus seminales, aut semini-formes è glandulis etiam urethræ, ac impotentiam, tum à nimio coitu, (b) tum à diuturnis equitationibus (c) fieri posse autumarem. Prioris exemplum habes in Juvene mastuprante apud Balth. *Timæum*. (d) Secundi cum utroque vitio apud Jo. Jac. *Manget*, in consultatione pro Nobilissimo: *Penis Flacciditas cum aff. hypoch. &c.* (e) Utriusque simul apud Jo. *Fortem*, *cons. vasor. sem. imbecil.* (f), & *cons. diffic. erect.*, *aren. mict.* (g) &c.

Interni.

Stimu-
lus.

Consimilia contingent à stimulo consimiliter, licet validioribus momentis, operante, validum tremorem, & sub-
ti-

(b) *Utrumque ab hac causa in Nob. Juv. Joa. Fortis loc. Infrá cit. con Ignav. ad Ven. B. Jac. Fontanus cons. 2. pro Nob.*

(c) *Vid. Hipp. de terr. aq. & loc. In Schytis.*

(d) *Cons. med. l. 3. cas. 49.*

(e) *Bibl. med. T. 2. lib. IX. lit. 1. Impot. vir.*

(f) *Cons. & resp med. T. 1. cent. 4.*

(g) *Id. Ib. & Gul. Ballon cons. med. l. 3. cons. congr. impot.*

tilissimarum partium excursum per eorundem filamenta inducente: Unde vel rigiditate suspendet, vel contractione validâ, vel maxima nervorum succussione promovebit secretionem; & tandem attritis non solum, sed & erosio filamentis laxitatem, stagnationes, exsiones inducet, ut patet à superiori Paragrapho, & à naturâ stimuli. Stimulum ad glandulas nostras potest efficere calculus, vel in eadem urethra, vel etiam in vesica, qui velut in Glande dolorem ac pruritum, sic etiam totâ urethrâ irritationem ac titillationem potest efficere; itâ arenulæ grandiores, urina acris, vel per se, vel per medicamenta acria, præsertim cantharides, injectiones erodentes, & consimilia.

Adjacentium quoque distensio nimia vel morbosa. Nimia ut in supra-dictis de nimia ad hanc partem oscillationis causis, difficilique fœcum egestionem; Morbosâ, ut priapismoide corporum nervosorum tensione, eorumque, Glandis, Vesicæ, Ani inflammatione (h) vel quavis lædente ad contactum glandula-

F 4

rum

(h) *Hipp. 5. aph. 63.*

rum, vel canalium tumiditate; vel ex-
crescentiâ, (i) vel extraneo hujus-modi.

Defectus.
Porro liquoris vitium in glandulis
tum Adstitibus, tum Disgregatis præci-
puum erit defectus aut exuberantia,
crassities aut dissolutio, hebetudo vel
acrimonia.

Defectus vel à defectu hujus liquo-
ris in toto, ut in nimia humidi absum-
ptione à dispeptis iisque peculiaribus;
præsertim calefacientibus, calida & sicca
aeris constitutione; aut glandularum
exilitate, vel defectu à natalibus (k),
aut inminuto, ablato, depravatove per
flacciditatem, vel tensionem, paralyfim,
vel convulsionem potentiarum clatere
naturali vel superaddito, uti quæcum-
que Penis flacciditatem possunt efficere
apud Mich. Ethmullerum (l); aut exhau-
stis à nimia venere, exercitationibus (m),
stimulis (n), aut stranguriis humiditate
sua viscicâ, qua obliniuntur glandulis;
Aut injectionibus adstringentibus, im-
pedi-

(i) Ut in canalibus salivalibus observavit Steph.
Blancardus *Inst. Med.* l. 12. atque ego etiam in mi-
lite regiminis Pedemontani Pedestris cum D. Scan-
zio observabam.

(k) Pag. 82.

(l) Colleg. Pract. spec. de morb. vir. & mulier.

(m) Pag. 85.

(n) Pag. 86.

pedimento obstructionis ; vel compres-
sionis, Casum habetis apud Bened. *Syl-*
vaticum (o) ; Aut liquoris debili appul-
su, impropotione cum secretoriis, vel
coagulatione. Velut defectûs seminei li-
quoris ememplum habetis apud Jo. *For-*
tem (p) ; A rarefactione (q) à debi-
litate facultatis animalis per nimium coi-
tum apud Bened. *Sylvaticum* (r) ; à Fa-
scino, & ab aff. hypoch. *Id. Ib.*

Defectu humoris oleosi urethram lu-
bricantis læsam urethram, cum ardo-
re urinæ, semenque non ita lubricè,
citèque ejaculatum iri animadvertit jam
pridem *Galenus*, & ipse confirmat Jo.
Riolanus (s), pluresque a se visos as-
ferit taliter affectos, victu humectante,
semicupiiis, & injectionibus olei amyg-
dalarum dulcium sanatos. Ex hac cau-
sa in pluribus affectu quopiam præci-
puorum viscerum inflammatorio, & fe-
bri acuta, aridove marasmo etiam fe-
nili defunctis, corii ad ignem exsicca-

Incom-
moda.

F 5 ti-

(o) *Cons. & resp. med. cent. 3. De Dysur. pro.*
Nob. Angl.

(p) *Cons. & Resp. Med. T. 1. Cent. iv. Pen.*
flac.

(q) *Id. Ib. Ignav. ad ven.*

(r) *Cons. & resp. Med. cent. 4. de tard. sem.*
ejac. pro nob. vir. Feder. Mart.

(s) *Enchyr. Anat. Pathol. l. 2, cap. 36.*

Depra-
vatione. ti instar , exsuccam aridamque urethræ
superficiem internam observavi. Nec
non & ulcera fieri poterunt in urethra,
difficiliùs quidem , sed eodem modo ac
in vesica , ex defectu uliginis etiam suæ,
adfuncto præsertim acri super-fluente.
Quin & ab ejus modi liquore deficiente,
aut etiam in salibus suis , & crassi malè
qualificato depravari venerem , inertem-
ve fieri posse , quem-ad-modum ex de-
ficiēte alteratâve salivâ depravatur gu-
stus , ac appetitus minuitur , opinarer ex
analogia harum cum alterius generis glan-
dulis.

Ab au-
ctâquan-
titate Augetur quantitas , aut copia hujus
liquoris in toto , ut per euchyma , eo-
rumque certa quædam alimenta ; aut ma-
jori glandularum proventu naturali , velut
in pluribus observavi ; aut valido san-
guinis impetu , fortè etiam cum minùs
facili regressu , uti contingit supino cor-
pore , facilique hujus liquoris secessione ,
quod in melancholicis præsertim evenit ;
Obstructione , aut compressione vena-
rum ; Stimulo ; Pressione , vel actis ani-
mi instinctu ad glandulas potentiis , vel
adjacentium distensione nimia , vel mor-
bosâ : vel earundem glandularum laxi-
tate.

Ab hac copia distendi dolorificè glan-
du-

dulas præsertim Conglomeratas, cum ^{Incom-} difficultate mingendi; distorqueri, vel ^{moda.} perrumpi tubulos excretorios, præsertim Disgregatarum, cum aliqua urethræ laceratione; proritari pollutiones, filamenta in urinis produci (t), gonorrhœas promoveri posse certum est: immò gonorrhœas fieri aliquando ostendetur inferiùs.

Ità crassities in hoc liquore contingit ^{A cras-} vel ab universali vitio sanguinis crassi, ^{fitie.} vel fixi in lymphâ potissimum; vel à laxitate partis; vel à frigido, aut quopiam coagulante. [ut acidæ sunt, ac adstringentes injectiones] suscepto.

Unde obstructio canalium excretoriorum, ut obstructa vascula ejaculantia observat Paul. *Amman*: Et Glandularum, & quæ ab obstructione pendent inflammationes spurix præsertim, Tumores, tubercula diversæ indolis, & concretiones argillofæ, prout cum impetu, aut lentescentiâ, aut acrimoniâ universi sanguinis, ac reliquorum humorum, glandularum istarum humoris crassities conjungitur. Quem-ad-modum in glandulis, & canalibus salivariis historiam ha-

(t) *Th. Bartholinus Epist. Resp. ad Daniel. Horstium.*

habet *Lentilius* (v), & Steph. *Blancardus* (x) H. *Roonhuysē* (y), in lachrymali Ant. *Nuck*. Fortè jam contingere glandularum præsertim *Adstitum* tumores, aut per urethræ longitudinem tubercula in Disgregatis: inutile profectò non erit imposterum animadvertere; utpote à quo multa possunt in excretionem tum urinæ, tum seminis, totâque Genitalium œconomiâ morbosè contingere. Tuberculum illud inter cololum vesicæ, & Rectum, dysuriæ, & stranguriæ causa apud Fabr. *Hildanum* (z), fortè in *Adstitibus* fuit. Dubiè dicere possumus glandulas sub cervice vesicæ in Franc. *Mullero* observatas (a), hujus quoque generis fuisse. Fortè bina tubercula utrinque orificio vesicæ formâ, & magnitudine testium apposita apud *Bartholin*. [cent. i. hist. 23.] *Adstites* fuerunt tumefactæ. Fortassè etiam lapilli è perinæo pueri educti (b), ab hisce glandulis *Adstitibus*

pe-

(v) *Ephem. A. 4. dec. 2.*

(x) *Inst. med. c. 12.*

(y) *l. 2. obs. 34.*

(z) *Cent. 1. obs. 71.*

(a) à *Salona* Reiselio.

(b) *Nic. Pechlinus apud Bonet. med. Septentr. T. 1. lib. 3 de Im. ventr. sect. 26. cap. 35.*

petiti sunt : cum mihi contigerit in Sen-
 ne Renibus , Liene , Pulmonibus calcu-
 lofo obſervare in tubulis Proſtatarum , &
 Vaſorum Deferentium ad Urethræ prin-
 cipium Ejaculantibus , parvos , & in-
 æquales calculos moleſtiam , & impedi-
 mentum tum urinæ ſuper-lapſuræ , tum
 ſemini effluxuro efficientes (c) : Adeò-
 que in Glandularum etiam iſtarum cana-
 libus dari calculus aliquando poterit.
 Nec non urethra humore ſuo fraudat-
 ur , aut improporcionado alluitur ; ut
 latera urethræ viſcoſo iſto agglutinentur
 potiùs , quàm parietes lubricentur , &
 urethræ orificium ad glandem potiùs , ut
 quandòque contingit , occludatur. Dy-
 ſuriam quatuor dierum à pituita meatum
 urinarium obſtruente , obſervat *Fore-
 ſtus* (d) , ut & aliam ex limoſo humore
 Penem obſtruente.

Hujus autem liquoris acrimonia ab
 acri etiam univerſalium liquidorum craſi, Ab A-
 crimo-
 nia, in-
 com-
 moda.
 aut per nimiam venerem , aut partis
 irritationem iſthuc converſa , conjunctis
 præſertim tenui partis texturâ , fibrarum
 tenſione , vaſorum plenitudine naturali-
 bus,

(c) *Huic ſimile obſervatum fuit à Theod. De Ma-
 yerne apud Frid. Loſſium lib. 1. obſ. 33.*

(d) *lib. xxv.*

bus, vel morboſis, ſimplices producit Gonorrhœas, & cum inflammatione, abraſione, aut ulcuſculis ardorem, ac difficultatem mingendi, coeundique aliquod impedimentum appor-
tat. *Aliquando, inquit Georg. Bagli-
vus (e) ut ſæpè vidi, Gonorrhœa cor-
ripiuntur etiam homines cum muliere
non infecta coeuntes. Id autem contin-
git in eis quorum ſanguis particulis
acribus, ſalinis ſcorbuticis, vel alte-
rius generis abundat, unde nimio con-
cubitus æſtu univerſa pene liquida in
motum concitatioſiorem poſita, undulando
inclinat ad locum in quo major eſt oſcil-
latio: quæ quoniam eſt circa vaſa ſemi-
nalia in inguine; ſi concubitus vehemens
fuerit, ac ſæpè repetitus, ſingulæ par-
tes acres ſalinæque, tunc excitatæ, &
in motum poſitæ deponi circa pudenda
incipient, ſemelque incepta deſiſtione,
veluti unda ſequente undam, aliæ
quæ remanent in liquidis, circulando
ibidem deponentur, & ſic fluxus pe-
rennitateſ producent, quæ Gonorrhœa
gallica videtur eſſe, ſed re vera non
eſt,*

(e) *Tract de fibr. motr. & morb. ſpecim. 3. reliq.
lib. de morb. ſucces. c. x. de morb. venet.*

est, quia cum muliere non infecta supponitur concubitus &c.

Gonorrhœæ ter geminam faciunt divisionem Medici. Primam quâ dormientes per insomnia, aut levi quavis occasione, semineo liquore viri ac mulieres (f), frequentius ac ferè continuò, cum, vel sinè voluptatis sensu foedantur. Talis erat ille apud *Rhasim* (g) & apud *Vesalium* (h) alter. Taliter affectus est Consanguineus meus, eâ de causâ infœcundus, & ad Tabem dorsalem proclivis absque luis minima suspicione.

Secundam, quâ catarrhi (i), quandoque etiam cum geniturâ aquosâ, & tenui (k), permixti specie, assiduus molestusque contingit fluor; De quo in mulieribus (l), ac in viris *Hippocrates*. (m)

Tertiam demum, quæ ex Lue venerea albidum, vel sub-citrinum virus, quandoque etiam purulentum (n) continuò

(f) *Ray Fort. l. 1. cent 1. conf. pro nob. virg.*

(g) *lib. 24. cont. 3. c. 1.*

(h) *De hum. corp. fabr. l. 5. c. 13.*

(i) *Cam Tomas. meth. cur cap. 57. Vessling.*

(k) *Lang. l. 2 ep. 5.*

(l) *1. de nat. mul.*

(m) *2. de Morb.*

(n) *Tb. à Vega de diff. febr. comm.*

tinuò , nec finè dolore , præsertim intermingendum , extillat.

Communis Medicorum consensus est primam pendere à tali sanguinis , organorumque genitalium constitutione , ut copia (o) calore (p) aut acrimoniâ (q) feminis , sanguine , ac spiritu turgente , Vesiculæ cum adjunctis suis affatim semen emittant ; aut tenui ac evanido existente semine , eædem etiam flaccidæ laxato sphincterulo carunculari (r) extillari sensim finè sensu (s) , aut levi quavis occasione (t) , permittant. Fortè etiam obstruuntur quandoque meatus vesicularum , feminine tenuius in sanguinem reventes.

Se-

(o) *Ut illa periodica apud Petr. Joh: Prukel: atque illa cum phimosi, & urin. ard. apud Th. Bonett.*

(p) *Talis erat pollutio. illa noct. post. morbil. apud Geib. Sam. Polil.*

(q) *Velut à cantharid. aut , à cathart. priapism. ut exemp. test. apud Plater l. 1. obs. med. p. 245. Sinebald. l. 3. Geneatnbr. Tr. 1. c. 12. & Tymæum à Nastart. seu sisimbr. Schenk. obs. l. 4.*

(r) *Apud. Gul. Ballon. cons. med. lib. 3. cons. pro Iuv. ad Vener. inutil.*

(s) *Casum habes. in Princ. quodam apud Cnoëfel. & Theod. Craanen, lib. Medic. 3. & Balb-Timæum. cas. med.*

(t) *in mict. & egerend, conat. Gul. Ballon. cons. med.*

Secundam à phlegmatis falsi, vel crudi copia, vel putrilagine, organa semina-
lia imbuente, atque laxante, præcipue
Prostatas in homine, utpotè glandulæ
sunt crassæ, ac spongiosæ magis (v), in
mulierè glandulis vaginalibus, vel uteri-
nis, præsertim quoque prostaticis.

Tertiam à venereo miasmate vasa se-
minea (x) vesiculas feminales (y) & ^{Tres} Prostatas (z) etiam in mulieribus (a) <sup>Gonorr-
rhœa</sup> insident, quibus inflammatis vel absces-^{species}-
sis (b), ulcus consequitur (c), aut laxi-
tas (d), atque curatis callositas super-
venit (e), aut in solis Prostaticis ulcus
est (f) ipsa Gonorrhœa, aut à Thymis
in urethra enatis purulentam saniem exu-
dan-

(v) *Gonorrh. spurie catharr. quotannis est. achyem;*
redeuntis hist. & curat hab apud Bened. Sylvat.
cons. & resp. med. cent 3. pro Nob. Forojul.

(x) *Lang. Epist. 5. l. 2.*

(y) *W. Wedel. de S. M. fac. c. 100. & pharm.*
p. 231.

(z) *Jo. Rioli. Ench. l. 2. c. 39. Steph Blancar.*
Inst. Chir. c. 42. de Gon.

(a) *Regn. de Graaf de mul. org. 9.*

(b) *Severin. apud. Th. Barthol. cent. ii. hist.*
36.

(c) *Sylv. De le Boë. append. tr. 3. ses 332 & seq.*

(d) *Andr. Moellenbroch. Eph. Germ.*

(e) *Wirfung.*

(f) *Rondolet. Pract. l. 2. c. 9. Palmær, 2. de*
Lue. c. 9. Welfch. obs. 67. Ballon. Epid. l. 2. p.
160.

dantibus (g), aut à carnosà virgæ substantià, primò inflammata, indè ulcerosa diathesi affectà (h), aut à Penis nutrimento in saniem degeneraro (i); De infectulo limaciformi in gonorrhœa infecti balano invento fides est Petr. *Borrellum*. (k)

Glandularum urethræ vitium in prima.

In omnibus hisce Gonorrhœis affici glandulas Urethræ minimè dubitarem. Nimirum quoad primam, legitimamq; Gonorrhœam, unà cum vesicularum seminalium vitio, illud etiam istarum glandularum conjungi, præter naturali pariter læsione ac naturali officio utrisque affini, atque communi.

In secunda.

Quoad secundam par est ratio de glandulis urethræ, ac de vaginalibus in fluore albo, atque hanc urethræ virilis, ac illum uteri coryzam, à ferino quodam catarrho cum Bern. *Valentino* (l); appellare possumus, *ex continuo humoris nutritii abscessu, & fœtidissima in hisce glandulis corruptione. Fur est* [inquit præ-

(g) *Theod. De Mayer. T: de Artbrit.*

(h) *Th. Syden. Epist. 2. resp. ad Hen. Pam.*

(i) *Car. Musit. de lue. Ven. lib. 3. cap. 2. de Gon.*

(k) *Obs. 53.*

(l) *Theop. Bonet. med. Septentr. part ult l. 4. de Mul. aff. sect. 1. obs. 1.*

prælaudatus *Valentinus*] Tyrannus ille morbosus, in partibus glandulosis stabulans; qui non vicinas modò, sed omnes insimul corporis humani partes suo defraudans nutrimento; in putrida hæc liquamina præcipitat. Atque hæc perfacile post gonorrhœas venereas contingit, facta nimirum ad hæc partes via; & stimulo ad easdem proritante; eò maximè quod cum substantia glandularum vesicularis sit, facilius distendi potest; tubulique, cum sint tenelluli, facilius eroduntur. Idque maximè; si vitium prostaticarum adjungatur, non modò in ipsamet glandula ejusque succis; sed & in vasis magno plexu Glandulas completentibus, quæ sæpius varicosa, & poliposo sanguine obstructa, aliquando & calculosis concretionibus impedita comperi. Ab acri urina leve aliquod stillicidium seminalis materiæ ortum notat *Raymund Fortis*. (a)

(a) *Cons. & resp. med.*

Tom. 2.

cent. 3.

In Tertia.

In tertiâ verò, nimirum virulentâ, Glandulas nostras affici; immò primam has esse morbi hujus sedem; ratio illa manifesta videtur; quam in præfatione attigimus; quòd facilius sit venerea miasmata viciniorem partem; utpote sunt hæ glandulæ, ingredi; quàm, ut prostatae sunt, remotiorem. Secundò. Quòd

satis liqueat , ab hisce glandulis provenire liquorem puriformem posse. Tertiò. Dolor ille , qui per totam urethræ longitudinem persentitur , non solum ejusdem fundum per prostates , sed totum urethræ tractum per glandulas suas affectum esse manifestò commonstrat. Quartò. Ex eo quòd dolor urgeat ubi confertiores sunt glandulæ , nimirum ad urethræ fossulam. Quintò. Quòd in aliquibus gonorrhœicis cadaveribus nullum in-prostatitis vitium compererim , sed urethram dumtaxat phlogosi affectam , Disgregatas turgidas , & viroso liquore scatentes. Sextò. Nostram confirmare sententiam videtur gonorrhœâ laborantium duorum cadaverum dissectio habita à Steph. *Blancardo* (a) qua Prostatas non semper in vitio esse deprehendit , sed vesiculas parvas in interna penis parte excitatas , purulentamque materiam fundentes. Septimò. Aliter difficilis admodum esset via quâ venenum hoc gonorrhœicum viris communicetur , luculento ejusdem *Blancardi* (b) testimonio: *Via , per quas*

(a) *Inst. med. Chir par. 3. cap. 42. de Gonorrhœia.*

(b) *loc. cit.*

quas humor iste, seu potius venenum in prostates ducitur, non adeò sunt manifestæ, idèdque res hic accuratè rimari oportet. Per arterias adduci nequit, quia vasa hæc sanguinem quidem adducunt, sed nunquam versùs superiora reducunt; neque venæ esse possunt, quoniam illæ ex omnibus partibus sanguinem superfluum ex tenuioribus vasculis ad majora, & ampliora revehant, neque nervi, neque vascula lymphatica sunt. Quales itaque vias demonstrabo? Ecce. Dico me peculiares ignorare vias. Quam-obrem alio quodam modo rem exponit eleganter.

Inventis autem Urethræ glandulis res In tertiâ tota in plano est. Supposito enim ex præfer- omnibus hujus sæculi Authoribus, in tim. quorum sententiam priores etiam coincidunt, infectum liquamen muliebri particulis falso-acidis tenuibus, ac volatilibus præsertim scatere. Ejusdem vividè tunc agitati halituosa portio quædam in apertam tunc Urethram, pariter ac masculi feminis aura in osculum tubasque oterinas, insinuat se se. Atque illius in morem connubit mucoso liquori urethræ superficiei & eidem pertinaciter adhæret, non sinè aliquo inter utrumque liquorem intestino motu; indeque

Acris
affluens
lymphæ
tunicas,
nec non
eorum
tenuissi-
ma va-
scula
erodit,
inflam-
matio-
nem,
indè
exulce-
ratio-
nem ex-
citât.

Lib. de
Gland.

Gonor-
thœæ
Ven. ef-
ficiendi
modus.

emicans salina portio tubulos, follicu-
losque glandularum subit, earumque
succis in miscet se se, membranulas fol-
liculorum stimulo salino corrugat, ab
iisque exprimit in folliculi cavitatem co-
piosius glandulare fluidum; Ac post-
quam aliquandiù in folliculo nidulaverit,
fermentatur, folliculum distendit, fo-
dicat, humorem copiosorem è glandu-
la prolecat, sibi que viam vel rupto ca-
naliculo violenter aperit. Undè ruptâ,
perforatâ, vel erosa glandularum com-
page atque perversâ, succoque nutritio
expresso, atque corrupto, copiosus
fit, assiduus, & saniosus liquoris pro-
fluxus, & velut de glandulis intestina-
libus *Cous. depascunt glandulæ dum ex-
primuntur, madorem exprimentes reli-
qui corporis abundantiam.*

Hinc est quòd primis ab impuro coitu
diebus tensio quædam in Urethra præ-
sentitur, indèque fermentatis jam liquo-
ribus, auctaque pressione primo semini-
formis, indè acore aucto erosus follicu-
lis, nutritius etiam formâ puris emanat
liquor; qui pro ratione veneni quod su-
scipitur, ac humorum suscipientis, cor-
ruptione remissiore, aut intensiore, ac
salium indole, colorem obtinet album,
cinereum, flavum, aut subviridem.

Quan-

Quandòque etiam læsis profundius vasis sanguineis, sero commiscetur sanguine affatim tincto, aut facto affluxu humorum vitiosorum disepulotica; aut vitio partis cachectica fit Gonorrhœa.

8. Ab hac Glandularum, & membranarum urethræ distensione, ac ulce-
rosa diathesi magnus ille doloris sensus in Pene quoties erigitur: perindè ac si valida manu constringeretur, qui noctu præcipuè urget, quoties in lecto æger capit incalescere. Hinc etiam illa
 veretri incurvatio, quam *Chordam* vo-
 cant, quòd Phlogosi tensa, & dolori-
 ficè contracta urethrâ, nervosis penis
 corporibus obsequi minimè possit.

Chor-
data.

Irrita-
tione
velut
inflam-
matione
erectio-
nem

9. Ità ardor urinæ, qui plerumque
*inter mingendum vix percipitur; at
 verò æger jam à mictu cessans per
 omnem urethræ ductum acriter admo-
 dum uritur, maximè quâ in glandem
 desinit.*

conti-
nuam
molien-
tibus.

10. Porro sensim diffunditur lues, Pro-
 & prostaticis etiam communicatur, tunc
 que Gonorrhœa curatu difficilis & co-
 piofa (a), ac diutina; ut illa Bergomen-
 sis illius apud Th. Bartholinum (b),

gressus
Gonor-
thœæ.

G 4 con-

(a) Ut illa apud Andr. Mollebrok in ephem.
 Germ.

(b) Cent. 11. hist. 36.

contingit. Neque ego *Ursingo* inficior
tria cadavera gonorrhœa extinctorum
 secanti, in quorum prostaticis vestigia ul-
 cerum, & cicatrices manifestas animad-
 vertit. „ Ego certè in cadaveribus lon-
 „ gâ gonorrhœâ afflictorum ulcera in
 „ prostaticis comperi, non ubi tubulata
 „ sunt, sed in eâ prostaticarum produ-
 „ ctione, quæ brevibus ductulis, aper-
 „ tisque orificiis facili exitu è Granulis
 „ glandulosis eructat liquorem limpi-
 „ dum magis atque serosum, quàm su-
 „ perior atque globosa portio prostata-
 „ rum; de quâ re Observationem ha-
 „ bes tertiam. Immò etiam propaga-
 „ tum, profundiusque insertum virus,
 „ in prædispositis præsertim corporibus,
 „ Phagedenico more urethram, ac ve-
 „ sicæ collum exedit, atque tum in
 „ meatu urinario, tum in cervice vesti-
 „ cæ carneas excrescentias producit, ac
 „ Perinæum, immò Anum, ac scro-
 „ tum ulcere fistuloso perforat, unde
 „ urina quasi cuniculis factis continen-
 „ ter extillat; Quales ego vidi duos,
 „ alterum salivatione mercuriali, ac to-
 „ picis sanatum, alterum, quem nulla
 „ curare opera potuit, viventem adhuc;
 „ & quod mireris, non adeò malè va-
 „ lentem, & Janitoris officium apud
 „

In Pro-
 stata-
 rum a-
 pendi-
 cem.

In Peri-
 næum.

In Scro-
 tum.

„ Illustrissimum D. Comitem de Verru-
 „ ca Dominum meum, alacriter fungen-
 „ tem, tresdecim licèt fistulis ad hasce
 „ partes perfossim!

Quem ad modum etiam vesiculas se- In vesti-
 minales infestat, immò facilè etiam testi- culas se-
 bus communicatur, quam *Herniam ve-* mina-
neris vocant; ubi victu, motu, remediis les, &
 Testes.
 incrassatur, rarefit, adstringitur, urgetur
 infectus seminalis liquor: In Testibus ut
 ibi stagnet, atque distendat; In Prostatis, Hernia
 vesiculis feminalibus, aut Deferente, ut in vene-
 reas,
 iisdem corrugationem, distensionem,
 pseudo-phlogosim efficiendo impediat
 fluxum à teste; sicque distendantur
 intestinula testium, comprimantur ra-
 muli sanguinei, atque lymphatici, ul-
 teriusque distendantur, tandemque rum-
 pantur. Sed & alius est producendæ
 Herniæ venereæ modus, si glandula con- Alius
 globata à fundo urethræ, Prostatis, ve- Herniæ
 venereæ
 ficulis feminalibus, Deferente, atque eti- modus.
 am Teste lymphatica recipiens, lym-
 pham, aut venereo, aut adstringentium,
 vel injectorum, vel assumptorum aci-
 do, & coagulabilem assatim combibat,
 eodem modò, ac glandula inguinalis
 per lymphatica penis venereum vene-
 num absorbet, atque in Bubonem extu-
 mescit; ità glandula feminalium Bubo-

ne quodam , ità dixerim , extumens , testium vasa lymphatica obstruendo , sanguinea comprimendo , utriusque regressum à teste impediet , coëctque in teste eodem excrescere.

Quòd si verò ulteriorem moram trahat , aut veneni activitatem sorbeat , suæque fracedinis fermento massæ sanguineæ crasim perturbet , tandem Luem veneream per corpus dispergit.

OBSERVATIONES MEDICÆ, ET ANATOMICÆ

De Glandularum Urethræ Morbis.

I.

Illustrissimus Comes N. N. æt. A. 7. Gonorr-
circiter , temperamento seroso-acri, ^{rhœa}
constitutione molli , tali corripiebatur ^{simplex}
gonorrhœâ , quâ sub-albidum ac visci- ^{in Pue-}
dum quidpiam continuò extillabat , non ^{ro.}
sinè ardore inter mingendum , totiusque
corporis emaciatione.

Repetitis purgationibus ex cassia præ-
fertim ; Jusculis demulcentibus ex al-
thæâ , malvâ , sem. melon. , tandem al-
Kalico-resinosi , nimirum succino albo
præp. & stib. diaphor. , ex bolo conser-
væ rosarum , unâ cum jusculis , & li-
quore possetico ex lignis fantal. citrin.
& assafr. , victuque humectante , &
abstemio , perfectè curabatur. His nem-
pè minor crudi dispeptique chili , adeò-
que lymphæ salso-acidæ proventus effe-
ctus est , quibus tum succus glandula-
rum , tum urinarum depravabatur.

II. Filia

II.

In Puella.

Filia Augustini *Aymar* Annorum 7. fluore albo in morem feri lactis nundum clarificati emittebat copiosè, non sine ardore aliquo, & pruritu. Taliter constitutam Nobilem Puellam 9. circiter annorum, repetitis blandis purgantibus, & pulveribus testaceis percuratam vidi.

III.

Stranguriosus ab ulcere calloso urethræ.

ANno 1702. 15. Aprilis die Sabbati Tabe consumptus in Nosocomio S. S. Mauricii, & Lazari obiit quidam, cui ad hæc confirmanda urethram unà cum vesica eximebam, favente Illustrissimo D. Paulo *Riccha* Medico Regio Primario, & Mecænate meo optimè merito. Vesicam reperi prorsus exinanitam atque contractam, intus vasis sanguineis admodum variegatam, uti quoque ad urethræ principium. Paulò infra, nempe ad extremum acutæ productionis carunculæ feminalis, interna urethræ tunica inæqualis apparebat ac aspera, & exsucca, ita ut velut excocta videretur. Hic primum est ubi Prostatas observabam productionem quandam glandularem emittere, sensim gracilescendo ad usque corporis spongiosi principium, è laterali regione

regione urethræ ad superiorem usque insistentem; Ex his plurimi emittuntur foras rivuli inordinatâ serie, ita tamen ut totam regionem occupent, quæ prostata-
rum protuberantiam, & spongiosum tuberculum interjacet, nempe ab infima portione carunculæ feminalis per totum tractum, qui acuta seu rostriformi carunculæ productione dividitur. Hæc autem ostiola in dato subjecto ampliora erant admodum, & velut fossulis excavata. Mox occurrebat portio jam dicta velut excocta, quæ fossulis quoque plurimis excavabatur verè ulcusculosis abrasâ etiam ulcusculis tunicâ.

Paulò infra, nempe ad regionem quæ musculi constrictores, seu Acceleratores desinunt, tota urethra ad altitudinem transversî semidigiti minimi velut callosa erat, ac contracta; Interior membrana verè exesa multis scatebat ulcusculis, liquorem sub viridem, ac virulentum deponentibus. (a)

Conglomeratæ nostræ omnino erant exiguæ, & exsuccæ, & canalis exiguissimus, ut eorundem hiatus in urethram nullo

(a) *Gangrenosim cum aliquali duritie contraxerat.*

nullo modo aparuerit ; horum tamen apertio ibi esse loci solet quâ ulcerosam maximè urethram notabamus

Urethræ reliquum passim leviter ex-
coriabatur, ejusque glandulæ disgregatæ
nihil liquidi emittebant.

I V.

Gonor-
rhoici
urethra
alterata
præfer-
tim ad
produ-
ctio-
nem
glandu-
losam
Prosta-
tarum
infra
procel-
sum ro-
strifor-
mem ca-
runculæ

Die Jovis 20. Aprilis Anno 1702:
Quidam cranio ad meditulum in-
ciso, interiori ossis tabulâ illæsâ pœni-
tùs nullis symptomatis ad usque vigesi-
mam morbi, Indè rigori febre, febrî
convulsione superveniente, vigesimâ
secundâ morbi obiit. Cranio resecto D.
Fassina S. R. C. Chirurgus primarius;
Vir omni virtute scientiâque ornatus, ea
quæ prudentissimè conjectatus fuerat ;
prænoverat, prædixeratque, invénit me
præsente omni veritate veriora; Supra
duram meningem nihil occurrebat extra-
vasatum, supra Piam autem, & cere-
brum, ad basim usque cerebri ad dex-
trum hemisphærium fætidissimum pus
exundabat. Cum intellexissem hunc Ve-
neri indulgentem, Gonorrhœâ cum ul-
cusculis venericis detentum, totum Viri-
le unâ cum Vesica eximebam, & primò
adno-

adnotabam Glandem extremè lividam , cui ad fossulas, quibus ad partem glandis inferiorem ad latera Frænuli præputii excavatur, duo excitabantur ulcuscula parva, quorum alterum non profundius admodum excavabatur, alterum adusque urethram profundius agebatur, cuniculo velut canali cartilagineo & fistuloso, qui in ipsa urethræ substantiâ, levius tamen desinebat. Apertâ verò urethrâ observabam primò distinctum illud Prostatarum corpus posticum, quod ductus suos ad partem [carunculæ superiorem] emittebat. Carunculæ feminalis productio rostriformis multos hinc inde ad latera emittebat tubulos, adjacens verò tractus, supra designatus in casu superius exposito, multis scatebat ostioli à glandosâ prostatarum productione, quæ tamen non adeò crassa erat, ac in casu supra explicato. Morbosi autem ad Gonorrhœam id fortè erat primò, quòd à glande ad medium ferè urethra velut inflammata livesceret, prope Prostatas verò, & præcipuè in rostriformi productione Carunculæ, aereis vesiculis passim elevaretur, quibus compressis excurreret per longum urethræ aereus veluti rivulus, hisque aereis vesiculis urethræ infra prostatas regio adusque

cor-

corpus spongiosum passim inæqualis, extuberabat : Quoad glandulas verò Prostatas, & glandulas nostras nihil contingebat peculiare.

V.

Gonorrh: ab
inflam-
matione
Disgre-
gata-
rum.
Ure-
thræ.

Anno 1703. Præsente Illustrissimo D. *Ravetti* Medico eximio, & Fautore meo singularissimo, secabam cadaver Gonorrhœici cujusdam, in quo urethra omninò inflammatione livescebat, glandulæque Disgregatæ inmodicùm extumebant.

VI.

Aneu-
risma
sinistri
canalis
Adsti-
tum
conglomera-
tum.

Favente eodem Promotore meo stranguriosus quidam Annorum 13. aut 14. vix puber, cadaver mihi suum secandum reliquit, & in urethra miram stranguriæ causam obtulit. Nempe ad radicem urethræ ad regionem Acceleratorum occurrebat vesicula instar faculi oblonga ferè pyriformis; nisi quod subrotundum alioquin fundum transversus sulcus angustaret, atque divideret, cujus pedunculus urethræ versùs Prostatas, reliquum corpus per longitudinem urethræ porrigebatur, ut ejusdem

dem fundus illius apicem spectaret. Cæcus undequaque in urethræ cavitatem erat sacculus; tenui membranâ pellucidus; apertus liquorem pellucidum; atque glutinosum effundebat ad semicochlear ferè. Infusus per sectionem in sacculum aer nullo in cavitatem urethræ hiatu perspirabat; at quidem versùs Adstitem sui lateris conglomeratam conversò siphunculò flatus ad Glandulam usque pertingebat; eodemque modo immissus etiam stilus pergebat. Adeoque constitit Sacculum illum membranosum nihil aliud esse quàm sinistri canalis Adstitis conglomeratæ Aneurisma ab ejusdem canalis obstructione; ad urethræ ingressum facilè ob enarrata superiùs impedimenta contingente; Velut in ductibus naso lachrymalibus, atque etiam salivalibus quandoque contingit. De cætero Vesica distenta enormiter atque inflammata; ejusque cervix nigrosi affecta, caruncula feminalis lacerata. Quæ ostendere curavimus, licèt imperitiùs, excusâ.

FIGURA I.

A Vesicæ urinariæ versùs collum portio (reliquo corpore ablato) inflammata, ac vasis sanguineis plurimis variegata.

A. Caruncula repetitò cathetere lacerata.

C. Adstitum conglomeratarum canalis dexter naturaliter constitutus.

D. Vesicula ex sinistro Adstitum conglomeratarum canali occluso eformata.

EE. Prostatae in principio Pubertatis, & per expressionem multiplicem inter micturitiones factam, exsuccæ.

FF. Musculi Ejaculatores.

GG. Urethra non-nihil inflammata.

HH. Corpus Glandis.

FIGURA II.

A ppositâ tabulâ exhibetur Vesica urinaria humana, unâ cum Urethra virili, ablatis nervosis Corporibus, per longitudinem superiorem à Glandis extremo ad usque Vesicam diffissa, omnia naturali magnitudine picta. Præcipuè tamen animus fuit exhibere glandulas Urethræ Conglomeratas cum canalibus suis, & Disgregatarum per Ure-

Urethræ longitudinem ostiola , & canaliculos varios , nec non Antiquorum Cervicis Vesicæ Sphincterem. Reliqua ad Figuræ complementum potius, quam ad rem meam addebam.

A. Vesica urinaria anteriùs e regione Cervicis ad usque medium secta.

a. Vesicæ Fundus.

B. Cervix.

CC. Ureteres.

cc. Ureterum obliquus in Vesicam ingressus.

DD. Vasa Deferentia.

dd. Vasa ad Vesiculas feminales excurrentia.

EE. Vesiculæ feminales.

F. Urethræ principum.

G. Caruncula feminalis cum duobus ostiolis Ejaculatoriis.

g. Carunculæ acuta seu rostri formis productio.

HH. Prostata.

II. Musculus statim infra Prostatarum protuberantiam Urethræ super extensus, seu Pseudo Sphincter, utrinque revolutus.

ii. Urethræ portio huic Musculo subiecta.

K. Tuberculum spongiosum Urethræ appensum.

Hh 2

L.

- L. Musculorum Acceleratorum alter ad majorem claritatem appositus.
- MM. Adstites Conglomeratæ.
- mm. Earum Ductus Urethræ superficiem excurrentes.
- NN. Horum ductuum orificia suillam sectam minorem ad usque Glandulas insinuandam admittentia.
- nnnn. Minores Ductus, parvaque Orificia Disgregatarum Urethræ Glandularum.
- OO. Majores Glandularum Disgregatarum ductus fetulam excipientes.
- o. Ductus medius ad Glandis osculum fetulam tenuissimam admittens.
- PP. Nervosa Urethræ Tunica
- pp. Tunica media spongiosa.
- QQ. Exterior fibrosa.
- RR. Glans per medium ad partem superiorem secta.
- rr. Glandis labella diviso Urethræ osculo.
- S. Cavernula Urethræ, Glandi subjecta.

F I N I S.

CATALOGUS LIBRORUM.

Aliquot Medicorum,

qui in Officina

BOUTESTENIANA,

Reperiuntur & Venduntur.

A.

Acta Lipsiensia cum supplementis & Indicibus, Compleet.

Alpinus de Præfagienda Vita & Morte, 4.

—— de Medicina Ægyptiorum, 4.

—— de Medicina Methodica, 4.

B.

Barchausen Elementa Chymiaë, 4.

Bellini Opera Omnia; 2. voll. 4.

Bennet Theatrum Tabidorum, 8.

Berengarius de Fractura Cranii, 8.

Blancardi Lexicon Medicum, 8.

Boerhaven Institutiones Medicæ, 8.

———— Aphorismi, 8.

———— Materia Medica, 8.

Boneti sepulchretum Anatomicum, 3. voll.
Folio.

Borellus de Motu Animalium, 4.

C.

Car. Pisonis Observationes & Consilia, 4.

Castelli Lexicon Medicum,

Celsus de re Medica Cn: Almeloyeen, 8.

Chesne-

Chesneau Observationes Medicæ, 4.
Cockburn Virulenta Gonorrhœæ sympto-
mata, &c. 8.
Cowper de Glandulis, 4.

D.

Dale Pharmacologia cum supplemento,
2 voll., 8.

Description des Os par Monsr. Petit, 12.

Diemerbroek Opera Omnia Anatomica, Folio
Duretus in Hippocratem, Folio.

E.

L'Emery Cours de Chymie, 8.

Eugalenus de Scorbuto, 8.

F.

Freind in Hippocratem, 4.

———— Emmenologia, 8.

———— de Purgantibus, 8.

———— Operationes Chymicæ, 8.

G.

Gaukes Praxis Medico Chirurgica, 8.

De Graef Opera Omnia Anatomica. 8.

H.

Hamilton de Febre Miliari. 8.

Harris de Morbis infantum. 8.

Hecquet de Purganda Medicina. 12.

Hippocrates Opera Omnia cum notis Foesii
2. voll. Folio.

———— Aphorismi ex editione Almela-
veen. 24.

Hollerius in Aphorismos Hippocratis. 8.

K.

Kerckringii Opera Omnia. 4.

L.

Leeuwenhoek Opera Omnia 4. voll. 4.

Lom-

Lommii Observationes Medicinales. 8.
—— de Curandis Febris. 8.

M.

Malpichii Opera Omnia. 4.
Markgravii Materia Medica. 4.
*Mauriceau Maladies des Femmes Grosses & ses
Observations 2. voll. 4.*
Musgrave de Arthritide Anomala. 8.

P.

*Palfin description Anatomique de parties de la
femme, qui servent a la Generation. 4.*
Pechlinus de Purgantibus. 8.
Pharmacopea Extemporanea Fulleri. 8.
Pharmacopea Leydensis.
—— Amstelodamensis.
Pitcarnii Opuscula. 4.
—— Elementa. 4.

R.

Ramazzini Opera Omnia. 4.
Reditus de Insectis 2. voll. 12.
—— de Animalibus. 4.
Riverius Reformatus 2. voll. 8.
Ruyschii Opera Omnia. 4.

S.

Sanctorii Medicina Statica. 12.
Sylvii de le Boe Opera Omnia. 4.

Swan-

Swammerdam Uteri Muliebris Fabrica, 4.

T.

Tulpii Observationes Medicæ, 8.

V.

Valsalva de Aure humana, 4.

W.

Wepferi Cicutæ Aquaticæ, 4.

Et adhuc multi alii libri in omni facultate.






Fig.







90/

108

